



Ospedale
di Bergamo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

17



prova Estratta
Gloria P.

PROVA PRATICA A

AVVISO PUBBLICO per prova pratica, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di infermiere - area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo sanitario

*Allegato B
 17/01/2014
 Dr. V. V.*


	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Un infermiere sta spiegando le modalità di trasmissione dell'epatite A ad un collega in addestramento. Qual è la sequenza corretta della catena dell'infezione:</p> <p>A. Soggetto infetto-feci-vettore-apparato gastroenterico; B. Soggetto infetto-vettore-circolo ematico-cute lesa; C. Soggetto infetto-apparato gastroenterico-trasmissione da droplet-feci; D. Trasmissione da contatto -apparato gastroenterico-soggetto infetto.</p>	
2	<p>I criteri che forniscono una buona valutazione della pervietà del catetere venoso centrale sono:</p> <p>A. È possibile iniettare facilmente; B. È possibile aspirare sangue facilmente; C. La persona assistita non segnala alterazioni o sensazioni dolorose durante il lavaggio/infusione; D. Tutte le risposte sono corrette.</p>	
3	<p>Per atelectasia polmonare si intende:</p> <p>A. Collasso del parenchima polmonare; B. Presenza di sangue nella cavità pleurica; C. Presenza di pus nel parenchima polmonare; D. Espettorazione di muco, catarro o sangue.</p>	
4	<p>Tra le conseguenze acute della disfagia quale è la più pericolosa:</p> <p>A. Malnutrizione; B. Broncopolmonite ab-ingestis; C. Gastroenterite cronica; D. Insufficienza renale.</p>	
5	<p>È possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo AB Rh negativo ad un paziente di gruppo:</p> <p>A. Gruppo 0 Rh positivo; B. Gruppo A Rh positivo; C. Gruppo AB Rh positivo; D. Gruppo B Rh negativo.</p>	
6	<p>Un infermiere deve posizionare un catetere vescicale con tecnica sterile. Quale accorgimento deve adottare per non contaminare il campo sterile:</p> <p>A. Aprire il telo sterile tenendolo lontano dal corpo; B. Manipolare il materiale in modo da evitare la contaminazione del campo sterile; C. Valutare l'integrità, l'indicatore di sterilità e la presenza di eventuale umidità delle confezioni sterili; D. Tutte le precedenti.</p>	
7	<p>Se si vuole somministrare 50 milligrammi di una soluzione all'1%, quanti millilitri della stessa soluzione è necessario utilizzare:</p> <p>A. 10 millilitri; B. 0,5 millilitri; C. 5 millilitri; D. 50 millilitri.</p>	



8	<p>Il Basic Life Support (BLS) comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Il pronto riconoscimento della assenza di coscienza, respiro, circolo;B. L'attivazione precoce del sistema di soccorso;C. L'esecuzione della RCP (Rianimazione cardio-polmonare) in caso di arresto cardiaco;D. Tutte le azioni precedenti.	
9	<p>Quale delle seguenti funzioni NON è svolta dal fegato:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Produrre e secernere la bile;B. Intervenire nel metabolismo dei lipidi, delle proteine e dei carboidrati;C. Demolire l'emoglobina;D. Mantenere l'equilibrio idrico ed elettrolitico nei liquidi corporei.	
10	<p>La Legge 26.2.1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie", afferma che il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato da:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Profilo professionale, Ordinamenti didattici di base e post-base, Codice deontologico;B. Codice deontologico, Profilo professionale, Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502;C. Profilo professionale, Mansionario, Codice deontologico;D. Profilo professionale, Mansionario.	
11	<p>La pianificazione assistenziale infermieristica:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Si basa sul metodo intuitivo di risoluzione dei problemi;B. Si applica solo quando è necessario;C. Si basa sul processo di assistenza infermieristica;D. Non si applica alle persone con alta complessità assistenziale.	
12	<p>Il "Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche" approvato dal Comitato Centrale della Federazione e dal Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche riuniti a Roma nella seduta del 12 e 13 Aprile 2019 all'art. 35 (contenzione) afferma che:</p> <ul style="list-style-type: none">A. L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico che se perseguito va attentamente monitorato;B. L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico di natura temporanea ed eccezionale;C. L'infermiere riconosce che la contenzione non è un atto terapeutico essa ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea;D. L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico solo se finalizzato alla salvaguardia cautelare dell'operatore.	
13	<p>Durante il monitoraggio con HOLTER il paziente deve:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Condurre una vita normale;B. Osservare il riposo assoluto;C. Svolgere attività impegnative dal punto di vista fisico;D. Alternare regolarmente periodo di riposo assoluto a momenti di attività fisica intensa.	
14	<p>La ventilazione non invasiva è una metodica che si realizza con:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Tubo oro-tracheale;B. Tubo naso-tracheale;C. Maschera nasale, maschera facciale, casco CPAP (Pressione positiva continua nelle vie aeree);D. Cannula tracheostomica.	

Handwritten notes:
15
16

15	Elencare sei tra le principali manifestazioni cliniche del paziente con ipoglicemia acuta: <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
16	Elenchi sei principali aspetti e/o parametri da monitorare nel paziente contenzionato: <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>





PROVA NON ESTRATTA

GouaP.

PROVA PRATICA B

AVVISO PUBBLICO per prova pratica, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di infermiere - area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo sanitario

Handwritten notes:
M. P. P.
U. P. P.
P. P. P.

2:

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Individua quali tra i presidi in elenco non sono riconosciuti come mezzi per la contenzione fisica della persona assistita:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Presidi ortopedici, bendaggi, fascia per carrozzina;B. Spondine e fermacaviglie;C. Fermapolsi e cintura pelvica;D. Cintura addominale e fermapolsi.	
2	<p>I criteri che forniscono una buona valutazione della pervietà del catetere venoso centrale sono:</p> <ul style="list-style-type: none">A. È possibile iniettare facilmente;B. È possibile aspirare sangue facilmente;C. La persona assistita non segnala alterazioni o sensazioni dolorose durante il lavaggio/infusione;D. Tutte le risposte sono corrette.	
3	<p>Che cosa indica la stranguria:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Difficoltà alla minzioneB. Insufficienza funzionale dello sfintere uretraleC. Dolore che segue o accompagna la minzioneD. Aumento della frequenza della minzione	
4	<p>In presenza di insufficienza renale, i principali nutrienti da monitorare sono:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Gli zuccheri semplici;B. I carboidrati complessi;C. Le proteine;D. I grassi saturi.	
5	<p>È possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo AB Rh negativo ad un paziente di gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Gruppo O Rh positivo;B. Gruppo A Rh positivo;C. Gruppo AB Rh positivo;D. Gruppo B Rh negativo.	
6	<p>Per isolamento si intende:</p> <ul style="list-style-type: none">A. La separazione di un paziente dall'ambiente esterno e l'attenzione a qualsiasi contatto;B. L'adozione di precauzioni aggiuntive per l'isolamento dei germi;C. Una misura di profilassi delle malattie infettive;D. Tutte le risposte sono corrette.	
7	<p>Se si vuole somministrare 50 milligrammi di una soluzione all'1%, quanti millilitri della stessa soluzione è necessario utilizzare:</p> <ul style="list-style-type: none">A. 10 millilitri;B. 0,5 millilitri;C. 5 millilitri;D. 50 millilitri.	

*Attilio Vanni
Vitali P. Rossi
Pirelli*

23

8	<p>In caso di ostruzione completa delle vie aeree la manovra di Heimlich:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Deve essere praticata solo se la vittima è priva di coscienza;B. Deve essere praticata solo se la vittima è in arresto cardiaco;C. Deve essere praticata solo se la vittima è ancora cosciente;D. Richiede l'uso della cannula faringea.	
9	<p>La chiusura della valvola tricuspide durante la sistole impedisce il reflusso di sangue:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Dal ventricolo destro nell'atrio destro;B. Dall'atrio destro all'atrio sinistro;C. Dall'atrio sinistro nell'aorta;D. Dall'atrio destro nell'arteria polmonare.	
10	<p>La Legge 26.2.1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie", afferma che il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato da:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Profilo professionale, Ordinamenti didattici di base e post-base, Codice deontologico;B. Codice deontologico, Profilo professionale, Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502;C. Profilo professionale, Mansionario, Codice deontologico;D. Profilo professionale, Mansionario.	
11	<p>La pianificazione assistenziale infermieristica:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Si basa sul metodo intuitivo di risoluzione dei problemi;B. Si applica solo quando è necessario;C. Si basa sul processo di assistenza infermieristica;D. Non si applica alle persone con alta complessità assistenziale.	
12	<p>Il "Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche" approvato dal Comitato Centrale della Federazione e dal Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche riuniti a Roma nella seduta del 12 e 13 Aprile 2019 all'art. 35 (contenzione) afferma che:</p> <ul style="list-style-type: none">A. L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico che se perseguito va attentamente monitorato;B. L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico di natura temporanea ed eccezionale;C. L'infermiere riconosce che la contenzione non è un atto terapeutico essa ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea;D. L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico solo se finalizzato alla salvaguardia cautelare dell'operatore.	
13	<p>Durante il monitoraggio con HOLTER il paziente deve:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Condurre una vita normale;B. Osservare il riposo assolutoC. Svolgere attività impegnative dal punto di vista fisico;D. Alternare regolarmente periodo di riposo assoluto a momenti di attività fisica intensa.	
14	<p>Durante la ventilazione con casco CPAP (Pressione positiva continua nelle vie aeree) l'infermiere deve assicurarsi che:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Il paziente sia in posizione seduta e tolleri l'interfaccia;B. Il casco sia costantemente gonfio;C. La PEEP (Pressione di fine espirazione) sia normofunzionanteD. Tutte le precedenti.	

*per
Marta
Stato di coscienza
P. de Viterbi*

15 Elenchi sei interventi da pianificare e mettere in atto nella gestione del catetere vescicale a permanenza posizionato in una persona assistita che deambula:

16 Indicare sei tra le principali manifestazioni cliniche presenti nel paziente in caso di trauma cranico:



Prova NON ESTRATTA

Genia P.

PROVA PRATICA C

AVVISO PUBBLICO per prova pratica, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di infermiere - area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo sanitario

Handwritten notes and signatures in the top left corner.

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Di che cosa è specifico l'antigene Australia (HBsAg):</p> <p>A. Dell'epatite da virus A; B. Dell'epatite da virus B; C. Dell'epatite da virus D; D. Delle epatiti da virus E.</p>	
2	<p>I criteri che forniscono una buona valutazione della pervietà del catetere venoso centrale sono:</p> <p>A. È possibile iniettare facilmente; B. È possibile aspirare sangue facilmente; C. La persona assistita non segnala alterazioni o sensazioni dolorose durante il lavaggio/infusione; D. Tutte le risposte sono corrette.</p>	
3	<p>Con il termine di "eziologia" si intende:</p> <p>A. La storia naturale di una malattia; B. Lo sviluppo di uno stato patologico; C. Le modalità di contagio di una malattia infettiva; D. Lo studio delle cause di una malattia.</p>	
4	<p>Per deiscenza di una ferita si intende:</p> <p>A. Una complicanza post operatoria con apertura spontanea della ferita; B. Una ferita che presenta un ematoma ai margini; C. Una ferita che presenta margini necrotici; D. Una ferita che presenta adesioni con superfici contigue.</p>	
5	<p>È possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo AB Rh negativo ad un paziente di gruppo:</p> <p>A. Gruppo 0 Rh positivo; B. Gruppo A Rh positivo; C. Gruppo AB Rh positivo; D. Gruppo B Rh negativo.</p>	
6	<p>In una persona assistita sottoposta a insulinoterapia è importante:</p> <p>A. Massaggiare con cura dopo ogni iniezione di insulina; B. Riscaldare l'insulina prima dell'iniezione; C. Eseguire la rotazione delle sedi di iniezione di insulina; D. Praticare un'iniezione intramuscolare.</p>	
7	<p>Se si vuole somministrare 50 milligrammi di una soluzione all'1%, quanti millilitri della stessa soluzione è necessario utilizzare:</p> <p>A. 10 millilitri; B. 0,5 millilitri; C. 5 millilitri; D. 50 millilitri.</p>	

26


Handwritten notes:
Mille tendi
Vita e Substantivo
P. 11/12/13
10/11/12

27

8	<p>La rianimazione cardio polmonare deve essere eseguita con il paziente in posizione:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Quella in cui si trova;B. Supina;C. Qualsiasi purché non si perda tempo;D. Posizione laterale di sicurezza.	
9	<p>Che funzione ha il liquor:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Nutre il sistema nervoso centrale;B. Protegge Sistema Nervoso Centrale e Sistema nervoso Periferico da traumi di tipo compressivo;C. Regola la pressione endocranica;D. Tutte le risposte sono corrette.	
10	<p>La Legge 26.2.1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie", afferma che il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato da:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Profilo professionale, Ordinamenti didattici di base e post-base, Codice deontologico;B. Codice deontologico, Profilo professionale, Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502;C. Profilo professionale, Mansionario, Codice deontologico;D. Profilo professionale, Mansionario.	
11	<p>La pianificazione assistenziale infermieristica:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Si basa sul metodo intuitivo di risoluzione dei problemi;B. Si applica solo quando è necessario;C. Si basa sul processo di assistenza infermieristica;D. Non si applica alle persone con alta complessità assistenziale.	
12	<p>Il "Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche" approvato dal Comitato Centrale della Federazione e dal Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche riuniti a Roma nella seduta del 12 e 13 Aprile 2019 all'art. 35 (contenzione) afferma che:</p> <ul style="list-style-type: none">A. L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico che se perseguito va attentamente monitorato;B. L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico di natura temporanea ed eccezionale;C. L'infermiere riconosce che la contenzione non è un atto terapeutico essa ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea;D. L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico solo se finalizzato alla salvaguardia cautelare dell'operatore.	
13	<p>Durante il monitoraggio con HOLTER il paziente deve:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Condurre una vita normale;B. Osservare il riposo assoluto;C. Svolgere attività impegnative dal punto di vista fisico;D. Alternare regolarmente periodo di riposo assoluto a momenti di attività fisica intensa.	
14	<p>La maschera Venturi, escludendo l'uso per tracheostomia, permette l'erogazione valori variabili di FIO2 ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Dal 24% al 60%;B. Dal 15% al 30%;C. Dal 70 % al 100%;D. Dal 95% al 99%.	

*15
Indicare sei tra le principali manifestazioni cliniche del paziente con embolia polmonare:
Per il 15/11/11*

15	Indicare sei tra le principali manifestazioni cliniche del paziente con embolia polmonare: <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
16	Elenchi tre interventi da mettere in atto in caso di ritrovamento di persona apparentemente incosciente: <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>





Ospedale
di Bergamo

Sistema Socio-Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

29



CORRETTORE PROVA PRATICA A

AVVISO PUBBLICO per prova pratica, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di infermiere - area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo sanitario

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Un infermiere sta spiegando le modalità di trasmissione dell'epatite A ad un collega in addestramento. Qual è la sequenza corretta della catena dell'infezione:</p> <p>A. Soggetto infetto-feci-vettore-apparato gastroenterico; B. Soggetto infetto-vettore-circolo ematico-cute lesa; C. Soggetto infetto-apparato gastroenterico-trasmissione da droplet-feci; D. Trasmissione da contatto -apparato gastroenterico-soggetto infetto.</p>	A
2	<p>I criteri che forniscono una buona valutazione della pervietà del catetere venoso centrale sono:</p> <p>A. È possibile iniettare facilmente; B. È possibile aspirare sangue facilmente; C. La persona assistita non segnala alterazioni o sensazioni dolorose durante il lavaggio/infusione; D. Tutte le risposte sono corrette.</p>	D
3	<p>Per atelectasia polmonare si intende:</p> <p>A. Collasso del parenchima polmonare; B. Presenza di sangue nella cavità pleurica; C. Presenza di pus nel parenchima polmonare; D. Espettorazione di muco, catarro o sangue.</p>	A
4	<p>Tra le conseguenze acute della disfagia quale è la più pericolosa:</p> <p>A. Malnutrizione; B. Broncopolmonite ab-ingestis; C. Gastroenterite cronica; D. Insufficienza renale.</p>	B
5	<p>È possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo AB Rh negativo ad un paziente di gruppo:</p> <p>A. Gruppo 0 Rh positivo; B. Gruppo A Rh positivo; C. Gruppo AB Rh positivo; D. Gruppo B Rh negativo.</p>	C
6	<p>Un infermiere deve posizionare un catetere vescicale con tecnica sterile. Quale accorgimento deve adottare per non contaminare il campo sterile:</p> <p>A. Aprire il telo sterile tenendolo lontano dal corpo; B. Manipolare il materiale in modo da evitare la contaminazione del campo sterile; C. Valutare l'integrità, l'indicatore di sterilità e la presenza di eventuale umidità delle confezioni sterili; D. Tutte le precedenti.</p>	D
7	<p>Se si vuole somministrare 50 milligrammi di una soluzione all'1%, quanti millilitri della stessa soluzione è necessario utilizzare:</p> <p>A. 10 millilitri; B. 0,5 millilitri; C. 5 millilitri; D. 50 millilitri.</p>	C



31

8	<p>Il Basic Life Support (BLS) comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Il pronto riconoscimento della assenza di coscienza, respiro, circolo;B. L'attivazione precoce del sistema di soccorso;C. L'esecuzione della RCP (Rianimazione cardio-polmonare) in caso di arresto cardiaco;D. Tutte le azioni precedenti.	D
9	<p>Quale delle seguenti funzioni NON è svolta dal fegato:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Produrre e secernere la bile;B. Intervenire nel metabolismo dei lipidi, delle proteine e dei carboidrati;C. Demolire l'emoglobina;D. Mantenere l'equilibrio idrico ed elettrolitico nei liquidi corporei.	D
10	<p>La Legge 26.2.1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie", afferma che il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato da:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Profilo professionale, Ordinamenti didattici di base e post-base, Codice deontologico;B. Codice deontologico, Profilo professionale, Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502;C. Profilo professionale, Mansionario, Codice deontologico;D. Profilo professionale, Mansionario.	A
11	<p>La pianificazione assistenziale infermieristica:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Si basa sul metodo intuitivo di risoluzione dei problemi;B. Si applica solo quando è necessario;C. Si basa sul processo di assistenza infermieristica;D. Non si applica alle persone con alta complessità assistenziale.	C
12	<p>Il "Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche" approvato dal Comitato Centrale della Federazione e dal Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche riuniti a Roma nella seduta del 12 e 13 Aprile 2019 all'art. 35 (contenzione) afferma che:</p> <ul style="list-style-type: none">A. L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico che se perseguito va attentamente monitorato;B. L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico di natura temporanea ed eccezionale;C. L'infermiere riconosce che la contenzione non è un atto terapeutico essa ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea;D. L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico solo se finalizzato alla salvaguardia cautelare dell'operatore.	C
13	<p>Durante il monitoraggio con HOLTER il paziente deve:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Condurre una vita normale;B. Osservare il riposo assoluto;C. Svolgere attività impegnative dal punto di vista fisico;D. Alternare regolarmente periodo di riposo assoluto a momenti di attività fisica intensa.	A
14	<p>La ventilazione non invasiva è una metodica che si realizza con:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Tubo oro-tracheale;B. Tubo naso-tracheale;C. Maschera nasale, maschera facciale, casco CPAP (Pressione positiva continua nelle vie aeree);D. Cannula tracheostomica.	C

<p>15</p>	<p>Elencare sei tra le principali manifestazioni cliniche del paziente con ipoglicemia acuta:</p> <p>sincope/perdita di coscienza/letargia/assopimento Tremori non intenzionali/spasmi muscolari Confusione mentale/agitazione/deterioramento cognitivo Debolezza stanchezza/astenia Tachicardia/alterazione FC Sudorazione, diaforesi/vasocostrizione periferica Cute fredda ed umida/pallore/brividi Cefalea Nervosismo irritabilità Vista offuscata o sdoppiata Fame, Vertigini/capogiro/disturbi equilibrio/deficit deambulazione Secchezza delle fauci</p> <p>1 risposta esatta: 0.5 punti 2 risposte esatte: 1 punto 3 risposte esatte: 1.5 punti 4 risposte esatte: 2 punti 5 risposte esatte: 2.5 punti 6 risposte esatte: 3 punti</p>
<p>16</p>	<p>Elenchi sei principali aspetti e/o parametri da monitorare nel paziente contenzionato:</p> <p>Respiro/saturazione sudorazione colorito della cute verifica contenzione (verificare tentativi di manomissione)7valutazione rimozione integrità della cute/lesioni da pressione/postura verifica accesso a sistemi di chiamata, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, temperatura corporea, minzione , alvo/parametri vitali somministrazione liquidi, somministrazione alimenti/stato nutrizionale stato di coscienza / agitazione/aspetti psicocomportamentali informazione/prescrizione rischio caduta dolore sicurezza/device</p> <p>1 risposta esatta: 0.5 punti 2 risposte esatte: 1 punto 3 risposte esatte: 1.5 punti 4 risposte esatte: 2 punti 5 risposte esatte: 2.5 punti 6 risposte esatte: 3 punti</p>



CORRETTORE PROVA PRATICA B

AVVISO PUBBLICO per prova pratica, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di infermiere - area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo sanitario

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Individua quali tra i presidi in elenco non sono riconosciuti come mezzi per la contenzione fisica della persona assistita:</p> <p>A. Presidi ortopedici, bendaggi, fascia per carrozzina; B. Spondine e fermacaviglie; C. Fermapolsi e cintura pelvica; D. Cintura addominale e fermapolsi.</p>	A
2	<p>I criteri che forniscono una buona valutazione della pervietà del catetere venoso centrale sono:</p> <p>A. È possibile iniettare facilmente; B. È possibile aspirare sangue facilmente; C. La persona assistita non segnala alterazioni o sensazioni dolorose durante il lavaggio/infusione; D. Tutte le risposte sono corrette.</p>	D
3	<p>Che cosa indica la stranguria:</p> <p>A. Difficoltà alla minzione B. Insufficienza funzionale dello sfintere uretrale C. Dolore che segue o accompagna la minzione D. Aumento della frequenza della minzione</p>	C
4	<p>In presenza di insufficienza renale, i principali nutrienti da monitorare sono:</p> <p>A. Gli zuccheri semplici; B. I carboidrati complessi; C. Le proteine; D. I grassi saturi.</p>	C
5	<p>È possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo AB Rh negativo ad un paziente di gruppo:</p> <p>A. Gruppo O Rh positivo; B. Gruppo A Rh positivo; C. Gruppo AB Rh positivo; D. Gruppo B Rh negativo.</p>	C
6	<p>Per isolamento si intende:</p> <p>A. La separazione di un paziente dall'ambiente esterno e l'attenzione a qualsiasi contatto; B. L'adozione di precauzioni aggiuntive per l'isolamento dei germi; C. Una misura di profilassi delle malattie infettive; D. Tutte le risposte sono corrette.</p>	D
7	<p>Se si vuole somministrare 50 milligrammi di una soluzione all'1%, quanti millilitri della stessa soluzione è necessario utilizzare:</p> <p>A. 10 millilitri; B. 0,5 millilitri; C. 5 millilitri; D. 50 millilitri.</p>	C

8	<p>In caso di ostruzione completa delle vie aeree la manovra di Heimlich:</p> <p>A. Deve essere praticata solo se la vittima è priva di coscienza; B. Deve essere praticata solo se la vittima è in arresto cardiaco; C. Deve essere praticata solo se la vittima è ancora cosciente; D. Richiede l'uso della cannula faringea.</p>	C
9	<p>La chiusura della valvola tricuspide durante la sistole impedisce il reflusso di sangue:</p> <p>A. Dal ventricolo destro nell'atrio destro; B. Dall'atrio destro all'atrio sinistro; C. Dall'atrio sinistro nell'aorta; D. Dall'atrio destro nell'arteria polmonare;</p>	A
10	<p>La Legge 26.2.1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie", afferma che il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato da:</p> <p>A. Profilo professionale, Ordinamenti didattici di base e post-base, Codice deontologico; B. Codice deontologico, Profilo professionale, Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502; C. Profilo professionale, Mansionario, Codice deontologico; D. Profilo professionale, Mansionario.</p>	A
11	<p>La pianificazione assistenziale infermieristica:</p> <p>A. Si basa sul metodo intuitivo di risoluzione dei problemi; B. Si applica solo quando è necessario; C. Si basa sul processo di assistenza infermieristica; D. Non si applica alle persone con alta complessità assistenziale.</p>	C
12	<p>Il "Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche" approvato dal Comitato Centrale della Federazione e dal Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche riuniti a Roma nella seduta del 12 e 13 Aprile 2019 all'art. 35 (contenzione) afferma che:</p> <p>A. L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico che se perseguito va attentamente monitorato; B. L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico di natura temporanea ed eccezionale; C. L'infermiere riconosce che la contenzione non è un atto terapeutico essa ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea; D. L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico solo se finalizzato alla salvaguardia cautelare dell'operatore.</p>	C
13	<p>Durante il monitoraggio con HOLTER il paziente deve:</p> <p>A. Condurre una vita normale; B. Osservare il riposo assoluto C. Svolgere attività impegnative dal punto di vista fisico; D. Alternare regolarmente periodo di riposo assoluto a momenti di attività fisica intensa.</p>	A
14	<p>Durante la ventilazione con casco CPAP (Pressione positiva continua nelle vie aeree) l'infermiere deve assicurarsi che:</p> <p>A. Il paziente sia in posizione seduta e tolleri l'interfaccia; B. Il casco sia costantemente gonfio; C. La PEEP (Pressione di fine espirazione) sia normofunzionante D. Tutte le precedenti.</p>	D



35

<p>15</p> <p><i>Q. 10</i></p>	<p>Elenchi sei interventi da pianificare e mettere in atto nella gestione del catetere vescicale a permanenza posizionato in una persona assistita che deambula:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Igiene mani prima e dopo posizionamento 2. Tecnica asettica/materiale sterile 3. Fissaggio adeguato (ridurre mobilità/evitare trazione) 4. Circuito chiuso 5. Se disconnessione: sostituzione circuito 6. Attenzione pieghe/flusso di drenaggio libero 7. No sacca sul pavimento 8. Sacca sotto livello vescica 9. Precauzioni standard ad ogni manipolazione 10. Cure igieniche di routine 11. Non irrigare con antibiotici la vescica di routine 12. Prelevare campioni in modo asettico 13. Rimozione appena possibile 14. No sostituzione sistematica di cv e circuito 15. Osservazione del meato <p>1 risposta esatta: 0.5 punti 2 risposte esatte: 1 punto 3 risposte esatte: 1.5 punti 4 risposte esatte: 2 punti 5 risposte esatte: 2.5 punti 6 risposte esatte: 3 punti</p>
<p>16</p>	<p>Indicare sei tra le principali manifestazioni cliniche presenti nel paziente in caso di trauma cranico:</p> <p>afasia transitoria o permanente (a seconda della gravità del danno) Disturbi visivi (vista indistinta o sdoppiata) Cefalea Pallore Diaforesi Otorrea o rinorrea Disorientamento Alterazione della funzione respiratoria Tachicardia Segni di aumento della pressione intracranica (vomito a getto, cefalea, modificazioni pupillari, compromissione dello stato di coscienza, compromissione motoria, triade di cushing [bradicardia_bradipnea_ipertensione]) diabete insipido (poliuria, polidipsia, osmolarità urinaria inferiore a quella plasmatica), crisi epilettiche</p> <p>1 risposta esatta: 0.5 punti 2 risposte esatte: 1 punto 3 risposte esatte: 1.5 punti 4 risposte esatte: 2 punti 5 risposte esatte: 2.5 punti 6 risposte esatte: 3 punti</p>



Ospedale
di Bergamo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

37



CORRETTORE PROVA PRATICA C

AVVISO PUBBLICO per prova pratica, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di infermiere - area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo sanitario

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Di che cosa è specifico l'antigene Australia (HBsAg):</p> <p>A. Dell'epatite da virus A; B. Dell'epatite da virus B; C. Dell'epatite da virus D; D. Delle epatiti da virus E.</p>	B
2	<p>I criteri che forniscono una buona valutazione della pervietà del catetere venoso centrale sono:</p> <p>A. È possibile iniettare facilmente; B. È possibile aspirare sangue facilmente; C. La persona assistita non segnala alterazioni o sensazioni dolorose durante il lavaggio/infusione; D. Tutte le risposte sono corrette.</p>	D
3	<p>Con il termine di "eziologia" si intende:</p> <p>A. La storia naturale di una malattia; B. Lo sviluppo di uno stato patologico; C. Le modalità di contagio di una malattia infettiva; D. Lo studio delle cause di una malattia.</p>	D
4	<p>Per deiscenza di una ferita si intende:</p> <p>A. Una complicanza post operatoria con apertura spontanea della ferita; B. Una ferita che presenta un ematoma ai margini; C. Una ferita che presenta margini necrotici; D. Una ferita che presenta adesioni con superfici contigue.</p>	A
5	<p>È possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo AB Rh negativo ad un paziente di gruppo:</p> <p>A. Gruppo O Rh positivo; B. Gruppo A Rh positivo; C. Gruppo AB Rh positivo; D. Gruppo B Rh negativo.</p>	C
6	<p>In una persona assistita sottoposta a insulinoterapia è importante:</p> <p>A. Massaggiare con cura dopo ogni iniezione di insulina; B. Riscaldare l'insulina prima dell'iniezione; C. Eseguire la rotazione delle sedi di iniezione di insulina; D. Praticare un'iniezione intramuscolare.</p>	C
7	<p>Se si vuole somministrare 50 milligrammi di una soluzione all'1%, quanti millilitri della stessa soluzione è necessario utilizzare:</p> <p>A. 10 millilitri; B. 0,5 millilitri; C. 5 millilitri; D. 50 millilitri.</p>	C

38

8	<p>La rianimazione cardio polmonare deve essere eseguita con il paziente in posizione:</p> <p>A. Quella in cui si trova; B. Supina; C. Qualsiasi purché non si perda tempo; D. Posizione laterale di sicurezza.</p>	B
9	<p>Che funzione ha il liquor:</p> <p>A. Nutre il sistema nervoso centrale; B. Protegge Sistema Nervoso Centrale e Sistema nervoso Periferico da traumi di tipo compressivo; C. Regola la pressione endocranica; D. Tutte le risposte sono corrette.</p>	D
10	<p>La Legge 26.2.1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie", afferma che il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato da:</p> <p>A. Profilo professionale, Ordinamenti didattici di base e post-base, Codice deontologico; B. Codice deontologico, Profilo professionale, Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502; C. Profilo professionale, Mansionario, Codice deontologico; D. Profilo professionale, Mansionario.</p>	A
11	<p>La pianificazione assistenziale infermieristica:</p> <p>A. Si basa sul metodo intuitivo di risoluzione dei problemi; B. Si applica solo quando è necessario; C. Si basa sul processo di assistenza infermieristica; D. Non si applica alle persone con alta complessità assistenziale.</p>	C
12	<p>Il "Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche" approvato dal Comitato Centrale della Federazione e dal Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche riuniti a Roma nella seduta del 12 e 13 Aprile 2019 all'art. 35 (contenzione) afferma che:</p> <p>A. L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico che se perseguito va attentamente monitorato; B. L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico di natura temporanea ed eccezionale; C. L'infermiere riconosce che la contenzione non è un atto terapeutico essa ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea; D. L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico solo se finalizzato alla salvaguardia cautelare dell'operatore.</p>	C
13	<p>Durante il monitoraggio con HOLTER il paziente deve:</p> <p>A. Condurre una vita normale; B. Osservare il riposo assoluto; C. Svolgere attività impegnative dal punto di vista fisico; D. Alternare regolarmente periodo di riposo assoluto a momenti di attività fisica intensa.</p>	A
14	<p>La maschera Venturi, escludendo l'uso per tracheostomia, permette l'erogazione valori variabili di FIO2 ovvero:</p> <p>A. Dal 24% al 60%; B. Dal 15% al 30%; C. Dal 70% al 100%; D. Dal 95% al 99%.</p>	A

R. M.
Vo
AL

39

15	<p>Indicare sei tra le principali manifestazioni cliniche del paziente con embolia polmonare:</p> <ul style="list-style-type: none">Tosse secca improvvisaDispneatachipneaDolore Toracico pleurico o anginosoTachicardia e Febbre sono comuniEmottisi graveEdema arti inferiori, caldi e dolentiCianosiSincopeSfregamento pleuricoSibili diffusi, rantoliTurgore giugulariSenso di morte imminente <p>1 risposta esatta: 0.5 punti 2 risposte esatte: 1 punto 3 risposte esatte: 1.5 punti 4 risposte esatte: 2 punti 5 risposte esatte: 2.5 punti 6 risposte esatte: 3 punti</p>
16	<p>Elenchi tre interventi da mettere in atto in caso di ritrovamento di persona apparentemente incosciente:</p> <ul style="list-style-type: none">-valuta la sicurezza della scena-chiedo aiuto- verifica la capacità di risposta- verificare la pervietà vie aeree- Guarda Ascolta Senti se il respiro è normale- Verifica presenza di polso centrale-verifico la presenza di trauma <p>1 risposte esatte: 1 punto 2 risposte esatte: 2 punti 3 risposte esatte: 3 punti</p>