

PROVA ESTRATTA

30

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

PROVA PRATICA A

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di operatore socio sanitario-area degli operatori – ruolo sociosanitario

Spazio per la risposta corretta	QUESITO
1.	<p>Nel caso in cui la persona assistita non sia presente in camera durante la somministrazione delle terapie orali si dovrà:</p> <p>A. Lasciare il farmaco sul comodino</p> <p>B. Lasciare il farmaco in consegna ad un vicino di letto</p> <p>C. Non lasciare il farmaco e cercare il paziente</p> <p>D. Cestinare il farmaco</p>
2.	<p>Se, durante l'esecuzione di una medicazione semplice, l'operatore rileva un peggioramento della ferita deve:</p> <p>A. Eseguire la medicazione come prescritto e quando possibile informare il medico</p> <p>B. Informare tempestivamente l'infermiere</p> <p>C. Eseguire la medicazione modificando la prescrizione per favorirne il miglioramento e successivamente informare l'infermiere</p> <p>D. Non deve informare nessuno</p>
3.	<p>Nel posizionare in carrozzina una persona assistita collaborante, la prima cosa da fare è:</p> <p>A. Portare nella stanza un sollevatore</p> <p>B. Accertarsi che ci sia un parente o del personale disponibile a sorvegliare la persona assistita</p> <p>C. Rimuovere la terapia endovenosa</p> <p>D. Informare la persona assistita</p>
4.	<p>L'emiplegia interessa:</p> <p>A. Solo gli arti superiori</p> <p>B. Solo gli arti inferiori</p> <p>C. Solo un arto</p> <p>D. Due arti della stessa parte del corpo</p>

5.	<p>Il pallone Ambu serve a:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Somministrare l'aerosol terapiaB. Ventilare il pazienteC. Eseguire esercizi di fisioterapia motoriaD. Misurare la frequenza respiratoria
6.	<p>In caso di shock ipovolemico il polso della persona assistita si presenta:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Pieno e frequenteB. Pieno e lentoC. AritmicoD. Debole, filiforme e frequente
7.	<p>Quale tra le seguenti è la complicanza più frequente del diabete?</p> <ul style="list-style-type: none">A. GottaB. RetinopatiaC. IpertiroidismoD. Tachicardia
8.	<p>Le vene sono:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Vasi sanguigni che trasportano il sangue ricco di ossigeno e sostanze nutritiveB. Vasi sanguigni che trasportano il sangue ricco di anidride carbonica dalle zone periferiche al cuoreC. Vasi sottilissimi che permettono lo scambio di sostanze con in tessutiD. Vasi del sistema linfatico
9.	<p>Nella prevenzione delle lesioni da pressione nei soggetti a rischio è necessario cambiare posizione alla persona assistita:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Solo quando la persona assistita lo richiedeB. Almeno ogni 2 o 4 ore o con maggiore frequenzaC. Ad ogni cambio turno degli operatoriD. Una volta al giorno

		In una persona assistita con la nutrizione enterale per sonda, l'OSS deve prestare attenzione che il sondino sia:
10.		<p>A. Ancorato alla cute con idoneo sistema di fissaggio per evitare che si sfili</p> <p>B. Pulito e non occluso</p> <p>C. Ben collegato al sistema di infusione</p> <p>D. Tutte le precedenti affermazioni sono corrette</p>
11.		<p>Un farmaco che deve essere mantenuto ad una temperatura compresa tra +2°C e +8°C va riposto:</p> <p>A. In frigorifero</p> <p>B. In congelatore</p> <p>C. In apposito armadio lontano da fonti di calore</p> <p>D. In cassaforte</p>
12.		<p>Per dose di un farmaco si intende:</p> <p>A. Il tempo e la modalità di somministrazione</p> <p>B. La quantità di medicamento che bisogna somministrare per ottenere un effetto curativo</p> <p>C. La forma farmaceutica</p> <p>D. La via di somministrazione</p>
13.		<p>Si definisce contaminazione:</p> <p>A. La presenza occasionale e transitoria di microrganismi su una superficie</p> <p>B. La presenza e la moltiplicazione di un microrganismo solo nel sangue</p> <p>C. La presenza e la moltiplicazione di microrganismi solo nelle vie urinarie</p> <p>D. La presenza e la moltiplicazione di microrganismi solo nelle vie respiratorie</p>
14.		<p>In quali contenitori vanno smaltiti gli strumenti taglienti e pungenti?</p> <p>A. Nei contenitori per rifiuti indifferenziati</p> <p>B. Nei contenitori per materiale infetto</p> <p>C. Nei contenitori di plastica rigida, resistenti alla puntura, per rifiuti sanitari speciali</p> <p>D. Nei contenitori per la raccolta della plastica e imballaggi</p>

15.		<p>La definizione di emottisi è:</p> <p>A. Emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse</p> <p>B. Emissione di sangue dal cavo orale</p> <p>C. Emissione di sangue dalle feci</p> <p>D. Emissione di sangue dalle urine</p>
16.		<p>Con il termine pollachiuria si intende:</p> <p>A. L'elevata frequenza delle minzioni</p> <p>B. L'eccessiva quantità di urina prodotta</p> <p>C. La perdita involontaria di urina</p> <p>D. La perdita involontaria di feci</p>
17.		<p>La procedura di disinfezione consiste in:</p> <p>A. Procedimenti ed operazioni di ordine pratico e sanitario atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia e di detersione</p> <p>B. Un complesso di procedimenti e di operazioni atti a rimuovere ed asportare rifiuti, polveri e sporco di qualsiasi natura delle superfici e degli ambienti</p> <p>C. Un processo che si propone di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni, o potenzialmente patogeni, ad eccezione delle spore, mediante l'applicazione di agenti fisici o chimici (ad es. calore, disinfettanti)</p> <p>D. Un processo che si propone di eliminare completamente le spore, mediante l'applicazione di alte temperature</p>
18.		<p>Quale stadio di una lesione da pressione è caratterizzato da un eritema non sbiancante su cute integra?</p> <p>A. Stadio I</p> <p>B. Stadio II</p> <p>C. Categoria di sospetta lesione dei tessuti profondi</p> <p>D. Lesione non stadiabile</p>
19.		<p>Quale delle seguenti vie di misurazione della temperatura fornisce in genere i valori più alti tra le opzioni proposte?</p> <p>A. Rettale</p> <p>B. Ottica</p> <p>C. Orale</p> <p>D. Ascellare</p>

20.	<p>Qual è l'azione prioritaria quando le mani sono visibilmente sporche?</p> <p>A. Frizione alcolica per 20-30 secondi fino ad evaporazione</p> <p>B. Indossare i guanti e rinviare l'igiene a fine procedura</p> <p>C. Lavaggio con acqua e sapone per 40-60 secondi, poi asciugatura</p> <p>D. Solo risciacquo rapido sotto acqua corrente</p>
21.	<p>Nel protocollo di igiene del corpo di una persona assistita con mobilità ridotta, quale sequenza è considerata più adeguata?</p> <p>A. Dalle zone distali a quelle prossimali</p> <p>B. Dalle zone meno contaminate a quelle più contaminate</p> <p>C. Prima arti superiori poi arti inferiori</p> <p>D. Prima la parte anteriore del corpo poi quella posteriore</p>
22.	<p>Un adulto riferisce dolore toracico improvviso e dispnea. Qual è la condotta corretta?</p> <p>A. Somministrare bevande calde e attendere</p> <p>B. Attivare immediatamente i soccorsi, far riposare in posizione semi seduta e monitorare</p> <p>C. Incoraggiare una camminata</p> <p>D. Dare analgesici senza indicazione</p>

23.	<p>Completate la tabella seguente con le sedi in cui vengono posizionate le derivazioni periferiche durante la registrazione dell'Elettrocardiogramma.</p>	
	ELETTRODO ROSSO	
	ELETTRODO NERO	
	ELETTRODO GIALLO	
	ELETTRODO VERDE	

PROVA NON ESTRATTA

36

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

PROVA PRATICA B

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di operatore socio sanitario-area degli operatori – ruolo sociosanitario

	Spazio per la risposta corretta	QUESITO
1.		<p>Quali fattori fisiologici possono aumentare il rischio di accumulo di farmaci nell'organismo?</p> <p>A. Insufficienza renale e alterazione della funzione epatica</p> <p>B. Presenza di vomito persistente</p> <p>C. Diminuzione del legame alle proteine plasmatiche</p> <p>D. Aumento della motilità intestinale</p>
2.		<p>Quali cibi sono da evitare in persone con ipertensione arteriosa?</p> <p>A. Cibi contenenti glutine</p> <p>B. Cibi iper-proteici</p> <p>C. Alimenti troppo salati</p> <p>D. Non ci sono indicazioni specifiche</p>
3.		<p>Per eseguire correttamente l'aerosol terapia è necessario:</p> <p>A. Posizionare la persona assistita in posizione sdraiata e somministrare subito dopo i pasti</p> <p>B. Posizionare la persona assistita in posizione seduta e somministrare lontano dai pasti</p> <p>C. Posizionare la persona assistita in posizione seduta e somministrare in qualsiasi momento della giornata</p> <p>D. Non ci sono indicazioni specifiche</p>
4.		<p>Una persona assistita con lesione da pressione a livello sacrale, quando è a letto deve:</p> <p>A. Cambiare posizione ogni due quattro ore o con maggiore frequenza</p> <p>B. Rimanere sempre supino</p> <p>C. Deve alternare tutte le posizioni, compresa quella supina</p> <p>D. Cambiare posizione una volta per turno</p>

5.	<p>Qual è l'intervento prioritario che l'OSS deve attuare durante una crisi epilettica di tipo "Grande Male" (tonico-clonica) mentre il paziente è a terra?</p> <p>A. Iniziare le manovre di rianimazione</p> <p>B. Cercare di immobilizzare gli arti del paziente con forza per bloccare le convulsioni e prevenire fratture</p> <p>C. Proteggere il capo del paziente da urti accidentali e allontanare oggetti pericolosi circostanti</p> <p>D. Somministrare acqua o farmaci per via orale non appena iniziano i primi movimenti convulsivi</p>
6.	<p>Nel contesto del Pronto Soccorso, che cosa si intende correttamente per "Triage"?</p> <p>A. Il trattamento farmacologico immediato somministrato dall'OSS per stabilizzare il paziente critico</p> <p>B. Il processo di accoglienza e classificazione dei pazienti in base alla gravità delle loro condizioni e all'urgenza delle cure, non in base all'ordine di arrivo</p> <p>C. La dimissione protetta del paziente verso strutture di lungodegenza o assistenza domiciliare</p> <p>D. Una tecnica di primo soccorso utilizzata esclusivamente in caso di ostruzione totale delle vie aeree da corpo estraneo</p>
7.	<p>Che cos'è una colostomia?</p> <p>A. Un'apertura della parete intestinale che raccorda il tratto intestinale del colon con l'esterno</p> <p>B. Un sistema di nutrizione artificiale</p> <p>C. Un'apertura nella parete addominale per consentire l'alimentazione</p> <p>D. Una metodica diagnostica</p>
8.	<p>L'ossigeno nel sangue viene trasportato legato a:</p> <p>A. Globuli bianchi</p> <p>B. Emoglobina</p> <p>C. Piastrine</p> <p>D. Anticorpi</p>

		Indica quale tecnica si utilizza nella rilevazione della Pressione Arteriosa con lo sfigmomanometro:
9.		<p>A. Metodo palpatorio e ascoltatorio</p> <p>B. Metodo cruento</p> <p>C. Metodo endoscopico</p> <p>D. Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta</p>
10.		<p>La coltura microbiologica di un campione fecale per identificare patogeni intestinali si chiama:</p> <p>A. Urocoltura</p> <p>B. Coprocoltura</p> <p>C. Emocoltura</p> <p>D. Mielocoltura</p>
11.		<p>Per preparato galenico si intende:</p> <p>A. Un farmaco in fiale e iniettabile in vena</p> <p>B. Un farmaco in compresse non divisibili</p> <p>C. Un farmaco personalizzato realizzato dal farmacista in laboratorio</p> <p>D. Un alimento sostitutivo</p>
12.		<p>Cosa bisogna fare quando in reparto scade un farmaco?</p> <p>A. Togliere il farmaco dall'armadio farmaceutico evidenziarlo con la dicitura "scaduti da non utilizzare", in attesa di renderli alla Farmacia</p> <p>B. Togliere il farmaco dall'armadio farmaceutico e smaltirlo nell'Halipak</p> <p>C. Togliere il farmaco dall'armadio farmaceutico e smaltirlo con i rifiuti solidi urbani</p> <p>D. Utilizzarlo indifferentemente dalla data di scadenza</p>
13.		<p>La disinfezione è:</p> <p>A. L'insieme delle misure attuate al fine di eliminare tutti i microrganismi viventi</p> <p>B. L'insieme delle misure attuate al fine di eliminare solo alcuni microrganismi presenti nell'ambiente</p> <p>C. L'insieme delle misure attuate al fine di ridurre, a un livello di "sicurezza", il numero dei microrganismi capaci di provocare malattia, presenti su una superficie o nell'ambiente</p> <p>D. L'insieme delle misure attuate al fine di garantire la sterilità dello strumentario chirurgico</p>

14.		<p>Dopo la rimozione dei guanti le mani devono essere igienizzate, perché?</p> <p>A. Sotto i guanti i microbi si moltiplicano</p> <p>B. I microbi possono passare sulle mani attraverso micro fori</p> <p>C. È presente il rischio di contaminazione delle mani durante le manovre di rimozione dei guanti</p> <p>D. Tutte le precedenti risposte sono corrette</p>
15.		<p>Che cosa indica il termine stranguria?</p> <p>A. Difficoltà alla minzione</p> <p>B. Insufficienza funzionale dello sfintere uretrale</p> <p>C. Dolore che segue o accompagna la minzione</p> <p>D. L'elevata frequenza delle minzioni</p>
16.		<p>Un paziente con difficoltà respiratorie si definisce:</p> <p>A. Dispnoico</p> <p>B. Cirrotico</p> <p>C. Iperteso</p> <p>D. Eupnoico</p>
17.		<p>Qual è la pratica corretta per l'igiene orale in persona allettata con rischio di inalazione involontaria di materiale orofaringeo o gastrico?</p> <p>A. Usare grandi quantità di acqua senza aspirazione</p> <p>B. Spazzolare con piccole quantità di acqua, aspirare, se disponibile un sistema di aspirazione, e posizionare in decubito laterale o semi seduto</p> <p>C. Evitare l'igiene per ridurre i rischi</p> <p>D. Usare solo collutorio concentrato</p>
18.		<p>Quale stadio di una lesione da pressione è caratterizzato da un eritema non sbiancante su cute integra?</p> <p>A. Stadio I</p> <p>B. Stadio II</p> <p>C. Categoria di sospetta lesione dei tessuti profondi</p> <p>D. Lesione non stadiabile</p>

		Quale delle seguenti vie di misurazione della temperatura fornisce in genere i valori più alti tra le opzioni proposte?
19.		<p>A. Rettale</p> <p>B. Ottica</p> <p>C. Orale</p> <p>D. Ascellare</p>
20.		<p>Qual è l'azione prioritaria quando le mani sono visibilmente sporche?</p> <p>A. Frizione alcolica per 20-30 secondi fino ad evaporazione</p> <p>B. Indossare i guanti e rinviare l'igiene a fine procedura</p> <p>C. Lavaggio con acqua e sapone per 40-60 secondi, poi asciugatura</p> <p>D. Solo risciacquo rapido sotto acqua corrente</p>
21.		<p>Nel protocollo di igiene del corpo di una persona assistita con mobilità ridotta, quale sequenza è considerata più adeguata?</p> <p>A. Dalle zone distali a quelle prossimali</p> <p>B. Dalle zone meno contaminate a quelle più contaminate</p> <p>C. Prima arti superiori poi arti inferiori</p> <p>D. Prima la parte anteriore del corpo poi quella posteriore</p>
22.		<p>Un adulto riferisce dolore toracico improvviso e dispnea. Qual è la condotta corretta?</p> <p>A. Somministrare bevande calde e attendere</p> <p>B. Attivare immediatamente i soccorsi, far riposare in posizione semi seduta e monitorare</p> <p>C. Incoraggiare una camminata</p> <p>D. Dare analgesici senza indicazione</p>

23.	<p>Elencare tre diversi tipi di lavaggio delle mani.</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
-----	--

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

PROVA PRATICA C

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di operatore socio sanitario-area degli operatori – ruolo sociosanitario

	Spazio per la risposta corretta	QUESITO
1.		<p>La prevenzione delle lesioni da pressione si attua:</p> <p>A. Adottando una mobilizzazione programmata e presidi antidecubito</p> <p>B. Lasciando la persona assistita nella posizione preferita</p> <p>C. Adottando i presidi antidecubito, ma senza mobilizzare la persona assistita</p> <p>D. Massaggiando energicamente la cute se arrossata</p>
2.		<p>Nel caso di broncopolmonite febbrile è necessario che la persona assistita:</p> <p>A. Resti immobile nel letto per tutta la durata del ricovero</p> <p>B. Venga stimolata ad idratarsi e al cambio di postura</p> <p>C. Venga sottoposta ad un percorso riabilitativo</p> <p>D. Indossi la maschera di Venturi</p>
3.		<p>Nel trattamento della stipsi si consiglia una dieta:</p> <p>A. Ricca di lipidi</p> <p>B. Povera di zuccheri</p> <p>C. Ricca di proteine</p> <p>D. Ricca di fibre</p>
4.		<p>In una persona assistita con diuresi spontanea quale presidio si deve utilizzare per la raccolta delle urine nelle 24 ore?</p> <p>A. Una sacca sterile con valvola anti reflusso</p> <p>B. Un bidoncino di capacità uguale o superiore ai 2000 ml.</p> <p>C. Una sacca sterile da 1000 ml.</p> <p>D. Nessuna delle precedenti risposte è corretta</p>
5.		<p>Quando è necessario intervenire con la manovra di Heimlich?</p> <p>A. Durante il sollevamento della persona assistita con ausili meccanici</p> <p>B. Durante lo svuotamento di drenaggi a caduta</p> <p>C. In caso di ostruzione delle vie aeree</p> <p>D. In caso di ostruzione del sondino nasogastrico</p>

6.		<p>Abitualmente come deve essere posizionato una persona adulta incosciente, che respira spontaneamente, e che vomita?</p> <p>A. Con la testa ruotata di lato</p> <p>B. Con le gambe della persona sollevate per favorire l'afflusso di sangue al cervello</p> <p>C. Supino</p> <p>D. In ortostasi</p>
7.		<p>Per rilevare lo stato di disidratazione di un paziente si controlla:</p> <p>A. La temperatura corporea</p> <p>B. La cute e le mucose</p> <p>C. Il numero di atti respiratori</p> <p>D. La glicemia</p>
8.		<p>L'apparato scheletrico è formato da:</p> <p>A. Ossa- articolazioni</p> <p>B. Tessuti- cartilagini</p> <p>C. Muscoli- articolazioni</p> <p>D. Muscoli- cartilagini</p>
9.		<p>Dopo aver eseguito il cambio di una medicazione semplice l'operatore deve:</p> <p>A. Riordinare e smaltire correttamente il materiale usato</p> <p>B. Aprire le finestre per areare il locale</p> <p>C. Procedere con il rifacimento del letto</p> <p>D. Procedere con l'igiene del paziente</p>
10.		<p>Indica, tra questi, i valori normali della glicemia in una persona adulta.</p> <p>A. Tra 160 e 90 mg/dl</p> <p>B. Tra 40 e 90 mg/dl</p> <p>C. Tra 80 e 110 mg/dl</p> <p>D. Tra 100 e 200 mg/dl</p>
11.		<p>La pomata oftalmica viene applicata:</p> <p>A. Nel padiglione auricolare</p> <p>B. Nell'occhio</p> <p>C. In bocca</p> <p>D. Sulle scottature</p>

		L'alimentazione parenterale viene somministrata per via:
12.		A. Venosa B. Arteriosa C. Per via orale D. Tramite sonda naso gastrica
13.		Quali dei seguenti fattori possono influenzare l'attività di un disinfettante? A. La concentrazione B. La temperatura C. Il corretto tempo di applicazione D. Tutte le risposte precedenti sono corrette
14.		Che cosa si intende per precauzioni standard: A. L'insieme dei comportamenti che devono essere rispettati solo da alcuni operatori sanitari B. Un insieme di norme finalizzate ad evitare la diffusione e/o la trasmissione di infezioni in ambiente ospedaliero sia da fonti note che da fonti ignote C. L'insieme dei comportamenti che devono essere rispettati solo dal personale che lavora al Pronto Soccorso D. L'insieme dei comportamenti che devono essere rispettati per garantire la sterilità in sala operatori
15.		Cosa si intende per melena? A. Feci normoformate B. Feci liquide C. Feci scure maleodoranti D. Feci bianche
16.		Cosa significa disfagia? A. Deglutizione difficoltosa B. Articolazione difficile della parola C. Impossibilità assoluta al passaggio del cibo nell'esofago D. Andatura incerta

17.		<p>La procedura di disinfezione consiste in:</p> <p>A. Procedimenti ed operazioni di ordine pratico e sanitario atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia e di detersione</p> <p>B. Un complesso di procedimenti e di operazioni atti a rimuovere ed asportare, rifiuti, polveri e sporco di qualsiasi natura delle superfici e degli ambienti</p> <p>C. Un processo che si propone di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni, o potenzialmente patogeni, ad eccezione delle spore, mediante l'applicazione di agenti fisici o chimici (ad es. calore, disinfettanti)</p> <p>D. Un processo che si propone di eliminare la maggior parte delle spore, mediante l'applicazione di alte temperature</p>
18.		<p>Quale stadio di una lesione da pressione è caratterizzato da un eritema non sbiancante su cute integra?</p> <p>A. Stadio I</p> <p>B. Stadio II</p> <p>C. Categoria di sospetta lesione dei tessuti profondi</p> <p>D. Lesione non stadiabile</p>
19.		<p>Quale delle seguenti vie di misurazione della temperatura fornisce in genere i valori più alti tra le opzioni proposte?</p> <p>A. Rettale</p> <p>B. Ottica</p> <p>C. Orale</p> <p>D. Ascellare</p>
20.		<p>Qual è l'azione prioritaria quando le mani sono visibilmente sporche?</p> <p>A. Frizione alcolica per 20-30 secondi fino ad evaporazione</p> <p>B. Indossare i guanti e rinviare l'igiene a fine procedura</p> <p>C. Lavaggio con acqua e sapone per 40-60 secondi, poi asciugatura</p> <p>D. Solo risciacquo rapido sotto acqua corrente</p>

		Nel protocollo di igiene del corpo di una persona assistita con mobilità ridotta,
21.		<p>quale sequenza è considerata più adeguata?</p> <p>A. Dalle zone distali a quelle prossimali</p> <p>B. Dalle zone meno contaminate a quelle più contaminate</p> <p>C. Prima arti superiori poi arti inferiori</p> <p>D. Prima la parte anteriore del corpo poi quella posteriore</p>
22.		<p>Un adulto riferisce dolore toracico improvviso e dispnea. Qual è la condotta corretta?</p> <p>A. Somministrare bevande calde e attendere</p> <p>B. Attivare immediatamente i soccorsi, far riposare in posizione semi seduta e monitorare</p> <p>C. Incoraggiare una camminata</p> <p>D. Dare analgesici senza indicazione</p>

	Esecuzione dell'Elettrocardiogramma: abbinare il giusto elettrodo periferico alla posizione sotto in cui si deve applicare	
23.	V1	A metà strada tra V2 e V4.
	V2	Quinto spazio intercostale, sulla linea emiclaveare.
	V3	Sulla linea ascellare anteriore, allo stesso livello orizzontale di V4.
	V4	Sulla linea ascellare media, allo stesso livello orizzontale di V4 e V5
	V5	Quarto spazio intercostale, a destra dello sterno.
	V6	Quarto spazio intercostale, a sinistra dello sterno.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

PROVA PRATICA D

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di operatore socio sanitario-area degli operatori – ruolo sociosanitario

	Spazio per la risposta corretta	QUESITO
1.		<p>Qual è la procedura corretta che l'OSS deve seguire (o indicare al paziente) per la raccolta di un campione di urina destinato all'urinocoltura?</p> <p>A. Raccogliere l'intera quantità della prima minzione del mattino in un contenitore non sterile</p> <p>B. Effettuare un'accurata igiene dei genitali esterni, scartare il primo getto di urina e raccogliere il "mitto intermedio" in un contenitore sterile</p> <p>C. Raccogliere le urine della sacca di un paziente portatore di catetere vescicale a permanenza dopo averle lasciate ristagnare per 2 ore</p> <p>D. Raccogliere il campione in qualsiasi momento della giornata senza necessità di igiene preventiva, purché il contenitore sia ben chiuso</p>
2.		<p>Indicare quali possono essere le possibili complicanze della terapia endovenosa.</p> <p>A. Stravaso</p> <p>B. Flebiti</p> <p>C. Infezioni</p> <p>D. Tutte le risposte sono corrette</p>
3.		<p>La vestizione della persona con apparecchio gessato ad un arto va eseguita:</p> <p>A. Infilando prima l'arto con apparecchio gessato</p> <p>B. Infilando prima l'arto libero da apparecchio gessato</p> <p>C. È indifferente quale arto infilare per primo</p> <p>D. Lasciando svestito l'arto con apparecchio gessato</p>
4.		<p>Quando una persona assistita allettata presenta nausea ed è in procinto di vomitare, abitualmente come deve essere posizionata per prevenire complicanze?</p> <p>A. Posizione supina con la testa leggermente arretrata per favorire la fuoriuscita del vomito</p> <p>B. Posizione laterale di sicurezza</p> <p>C. Posizione di Trendelenburg</p> <p>D. La posizione è indifferente nella prevenzione delle complicanze</p>

5.	<p>La posizione di Trendelenburg è:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Una posizione con la testa più bassa rispetto alle gambe B. Una posizione semi seduta con gambe flesse C. Una posizione con la testa più alta rispetto alle gambe D. Una posizione supina in cui la posizione delle gambe e della testa sono alla stessa altezza
6.	<p>In un paziente diabetico è importante controllare:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. I denti per il rischio carie B. Le mucose per il rischio anemia C. I piedi per il rischio di lesioni D. L'andatura per il rischio cadute
7.	<p>I capillari sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Vasi sanguigni che trasportano il sangue ricco di ossigeno e sostanze nutritive B. Vasi sanguigni che trasportano il sangue ricco di anidride carbonica dalle zone periferiche al cuore C. Vasi sottilissimi che permettono lo scambio di sostanze con in tessuti D. Vasi di grosso calibro
8.	<p>Indicare l'esatta tecnica per effettuare la disinfezione della ferita in una medicazione chirurgica non settica.</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Procedere alla disinfezione della ferita dal centro alla periferia B. Procedere alla disinfezione della ferita dalla periferia al centro C. Procedere alla disinfezione della ferita in senso lineare D. Non esiste una indicazione specifica
9.	<p>Durante l'esecuzione di un microclisma la postura corretta che la persona deve tenere è:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Supina B. Sul fianco destro con la gamba sinistra flessa C. Sul fianco sinistro con la gamba destra flessa D. Prona

		I colluttori vengono usati:
10.		<p>A. Nell'igiene del cavo orale</p> <p>B. Per l'aerosolterapia</p> <p>C. Per idratare la pelle</p> <p>D. Per detergere il viso</p>
11.		<p>Il serbatoio degli umidificatori nell'ossigenoterapia è riempito con:</p> <p>A. Acqua sterile</p> <p>B. Acqua corrente</p> <p>C. Acqua minerale</p> <p>D. Acqua povera di residuo fisso</p>
12.		<p>Secondo la classificazione internazionale delle lesioni da pressione, una lesione con perdita totale dello spessore cutaneo con esteso danno tissutale, necrosi o interessamento di muscolo, osso o strutture di sostegno corrisponde a:</p> <p>A. Grado I</p> <p>B. Grado II</p> <p>C. Grado III</p> <p>D. Grado IV</p>
13.		<p>Quale effetto si cerca di generare con la manovra di Heimlich in un adulto cosciente con ostruzione delle vie aeree?</p> <p>A. Provocare il vomito per espellere il corpo estraneo</p> <p>B. Generare una tosse artificiale per espellere il corpo estraneo</p> <p>C. Indurre uno spasmo laringeo protettivo</p> <p>D. Provocare dolore per stimolare la respirazione profonda</p>
14.		<p>Per tachicardia si intende:</p> <p>A. Aumento della frequenza respiratoria</p> <p>B. Diminuzione della frequenza cardiaca</p> <p>C. Aumento della frequenza cardiaca</p> <p>D. Diminuzione della frequenza respiratoria</p>

15.	<p>Con il termine profilassi s'intende:</p> <p>A. L'insieme delle misure volte ad impedire fenomeni di assenteismo</p> <p>B. L'insieme delle prestazioni mediche ed infermieristiche domiciliari</p> <p>C. L'insieme delle misure volte a prevenire l'insorgenza e la diffusione delle malattie</p> <p>D. L'insieme delle misure antincendio</p>
16.	<p>Qual è la condotta corretta di fronte a segni di spostamento della sonda nasogastrica?</p> <p>A. Tagliare la sonda e fissare nuovamente</p> <p>B. Se la persona assistita non lamenta dolore è possibile continuare con la somministrazione</p> <p>C. Arrestare la somministrazione e informare immediatamente l'infermiere</p> <p>D. Spingere la sonda più in profondità</p>
17.	<p>Quale dei seguenti non è un sintomo tipico dell'ipoglicemia grave?</p> <p>A. Tachicardia</p> <p>B. Sudorazione notturna</p> <p>C. Poliuria</p> <p>D. Alterazione del livello di coscienza</p>
18.	<p>Quale delle seguenti stomie è utilizzata principalmente per l'eliminazione delle feci?</p> <p>A. Colostomia</p> <p>B. Gastrostomia</p> <p>C. Tracheostomia</p> <p>D. Ureterostomia</p>
19.	<p>Una dieta povera di residui finalizzata a ridurre il volume e la frequenza delle evacuazioni si classifica come:</p> <p>A. Iperproteica</p> <p>B. Ipoproteica</p> <p>C. Astringente</p> <p>D. Lassativa</p>

20.	<p>Quale via di somministrazione farmacologica fornisce l'inizio d'azione più rapido e la disponibilità sistematica immediata?</p> <p>A. Via orale B. Via endovenosa C. Via intramuscolare D. Via sottocutanea</p>
21.	<p>Come si definisce la temperatura corporea inferiore a 35°C?</p> <p>A. Ipotermia B. Febbricola C. Ipotermia severa D. Ipertermia</p>
22.	<p>Per eseguire l'aspirazione delle secrezioni orofaringee, quale posizione deve assumere la persona assistita?</p> <p>A. Decubito supino B. Decubito prono C. Posizione semi seduta D. Di Trendelenburg</p>

23.	<p>Elencare tre azioni da mettere in atto in caso di persona assistita con temperatura corporea elevata:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
-----	---

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

PROVA PRATICA E

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di operatore socio sanitario-area degli operatori – ruolo sociosanitario

	Spazio per la risposta corretta	QUESITO
1.		<p>Occorre avere particolare attenzione con il materiale sterilizzato perché:</p> <p>A. Si può utilizzare entro e non oltre 3 giorni</p> <p>B. Si può utilizzare entro e non oltre una settimana</p> <p>C. Va aperto solo al momento dell'utilizzo e non oltre la data di scadenza che ne garantisce la sterilità</p> <p>D. Tutte le risposte precedenti sono corrette</p>
2.		<p>Per comunicare con le persone ipoacusiche occorre:</p> <p>A. Parlare sempre a voce alta</p> <p>B. Parlare vicino all'orecchio</p> <p>C. Parlare lentamente ponendosi di fronte alla persona</p> <p>D. Parlare velocemente</p>
3.		<p>Nel rifacimento del letto occupato da paziente non autosufficiente bisogna:</p> <p>A. Lasciare la persona assistita in posizione supina e procedere al rifacimento del letto dall'alto verso il basso</p> <p>B. Lasciare la persona assistita in posizione supina e arrotolare la biancheria pulita sotto la schiena</p> <p>C. Girare la persona assistita di lato, arrotolare la biancheria sporca sotto la schiena del paziente, stendere la biancheria pulita nella parte di materasso rimasta libera</p> <p>D. Mettere la persona assistita prona e stendere la biancheria pulita</p>
4.		<p>Quando una persona assistita allettata presenta nausea ed è in procinto di vomitare, abitualmente come deve essere posizionata per prevenire complicanze?</p> <p>A. Posizione supina con la testa leggermente arretrata per favorire la fuoriuscita del vomito</p> <p>B. Posizione laterale di sicurezza</p> <p>C. Posizione di Trendelenburg</p> <p>D. La posizione è indifferente nella prevenzione delle complicanze</p>

5.	<p>Di fronte ad una crisi epilettica il primo soccorritore deve:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Accompagnare a terra la personaB. Allontanare dalla persona tutti gli oggetti contundentiC. Evitare che la persona si morda la linguaD. Tutte le risposte precedenti sono corrette
6.	<p>Come prestare soccorso ad un soggetto in stato di shock?</p> <ul style="list-style-type: none">A. Dargli da bere acqua e zucchero ed effettuare la respirazione artificialeB. Stenderlo e coprirlo con una copertaC. Effettuare il massaggio cardiacoD. Effettuare la manovra di Heimlich
7.	<p>Le arterie sono:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Vasi che conducono il sangue ossigenato dal cuore alla periferiaB. Vasi che conducono il sangue solo verso la parte alta del corpoC. Vasi che conducono il sangue ossigenato dalla periferia al cuoreD. Vasi del sistema linfatico
8.	<p>Nei pazienti diabetici:</p> <ul style="list-style-type: none">A. La glicemia ha tendenzialmente valori altiB. La creatinina si alzaC. La glicemia è bassaD. La pressione arteriosa è bassa
9.	<p>Tra le seguenti, quali sono le sedi corrette per la rilevazione della temperatura corporea:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Auricolare, ascellare, interdigitale, orale, rettaleB. Auricolare, ascellare, orale, rettaleC. Auricolare, ascellare, malleolare, orale, rettaleD. Auricolare, oculare, malleolare, orale, rettale
10.	<p>L'ossigeno durante la somministrazione deve essere sempre:</p> <ul style="list-style-type: none">A. RaffreddatoB. UmidificatoC. NebulizzatoD. Tutte le precedenti risposte sono corrette

11.	<p>In quale delle seguenti situazioni cliniche è assolutamente controindicato il clistere di pulizia?</p> <p>A. Persona assistita con stipsi cronica</p> <p>B. Preparazione alla colonscopia</p> <p>C. Persona assistita con sospetta perforazione intestinale</p> <p>D. Prima di un intervento di chirurgia addominale</p>
12.	<p>Nell'igiene della persona assistita allettata, qual è il principio fondamentale che giustifica l'ordine con cui si lavano le diverse parti del corpo?</p> <p>A. Facilitare l'asciugatura delle aree lavate</p> <p>B. Procedere dalle aree più pulite a quelle contaminate</p> <p>C. Minimizzare i tempi</p> <p>D. Comodità dell'operatore sanitario</p>
13.	<p>La procedura di decontaminazione è necessaria:</p> <p>A. Solo nel caso di contaminazione di piccole quantità di materiale organico</p> <p>B. Sempre nel caso di contaminazione di materiale organico</p> <p>C. Solo nel caso di contaminazione con sostanza chimiche</p> <p>D. Solo nel caso di contaminazione di alimenti</p>
14.	<p>La via più frequente di trasmissione dei microorganismi in ospedale è:</p> <p>A. L'Acqua</p> <p>B. L'Aria</p> <p>C. Le mani</p> <p>D. Gli alimenti confezionati</p>
15.	<p>La diminuzione della frequenza cardiaca si definisce:</p> <p>A. Bradicardia</p> <p>B. Aritmia</p> <p>C. Apnea</p> <p>D. Tachicardia</p>

16.	<p>Qual è la condotta corretta di fronte a segni di spostamento della sonda nasogastrica?</p> <p>A. Tagliare la sonda e fissare nuovamente</p> <p>B. Se la persona assistita non lamenta dolore è possibile continuare con la somministrazione</p> <p>C. Arrestare la somministrazione e informare immediatamente l'infermiere</p> <p>D. Spingere la sonda più in profondità</p>
17.	<p>Quale dei seguenti non è un sintomo tipico dell'ipoglicemia grave?</p> <p>A. Tachicardia</p> <p>B. Sudorazione notturna</p> <p>C. Poliuria</p> <p>D. Alterazione del livello di coscienza</p>
18.	<p>Quale delle seguenti stomie è utilizzata principalmente per l'eliminazione delle feci?</p> <p>A. Colostomia</p> <p>B. Gastrostomia</p> <p>C. Tracheostomia</p> <p>D. Ureterostomia</p>
19.	<p>Una dieta povera di residui finalizzati a ridurre il volume e la frequenza delle evacuazioni si classifica come:</p> <p>A. Iperproteica</p> <p>B. Ipoproteica</p> <p>C. Astringente</p> <p>D. Lassativa</p>
20.	<p>Quale via di somministrazione farmacologica fornisce l'inizio d'azione più rapido e la disponibilità sistematica immediata?</p> <p>A. Via orale</p> <p>B. Via endovenosa</p> <p>C. Via intramuscolare</p> <p>D. Via sottocutanea</p>

21.	<p>Come si definisce la temperatura corporea inferiore a 35°C?</p> <ul style="list-style-type: none">A. IpotermiaB. FebbricolaC. Ipotermia severaD. Ipertermia
22.	<p>Per eseguire l'aspirazione delle secrezioni orofaringee, quale postazione deve assumere la persona assistita?</p> <ul style="list-style-type: none">A. Decubito supinoB. Decubito pronoC. Posizione semi sedutaD. Trendelemburg

23.	<p>In caso di riscontro casuale di persona assistita in apparente stato di incoscienza, con parametri vitali conservati, elencare 3 azioni mettere in atto?</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
-----	--

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

PROVA PRATICA F

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di operatore socio sanitario-area degli operatori – ruolo sociosanitario

	Spazio per la risposta corretta	QUESITO
1.		<p>Quando una persona è portatrice di sondino naso gastrico come viene eseguita l'igiene del naso?</p> <p>A. Si pulisce la cute con manovre asettiche e materiale sterile</p> <p>B. Si pulisce la cute con abbondante acqua e sapone</p> <p>C. Si pulisce la cute con movimenti delicati e, se necessario, si rinnova il cerotto di fissaggio del sondino</p> <p>D. Si sfila il sondino nasogastrico per permettere una migliore igiene</p>
2.		<p>Cosa si osserva in occasione della comparsa di una lesione da pressione al primo stadio di sviluppo?</p> <p>A. Necrosi tissutale</p> <p>B. Arrossamento della cute</p> <p>C. Lesione di continuo della cute e del sottocute</p> <p>D. Lesione sottocutanea</p>
3.		<p>In una persona portatrice di catetere a permanenza si deve:</p> <p>A. Eseguire l'igiene dei genitali con manovra asettica</p> <p>B. Eseguire l'igiene dei genitali con particolare attenzione al meato urinario</p> <p>C. Eseguire l'igiene dei genitali con particolare attenzione alla sacca di raccolta delle urine</p> <p>D. Sfilare il catetere per permettere una migliore igiene del meato urinario</p>
4.		<p>In caso di persona assistita con diarrea bisogna:</p> <p>A. Consigliare una dieta povera di fibre</p> <p>B. Consigliare una dieta senza glutine</p> <p>C. Consigliare una dieta aproteica</p> <p>D. Tutte le risposte sono corrette</p>
5.		<p>Quali tra i sintomi sotto elencati sono possibili indicatori di sospetto infarto miocardico acuto?</p> <p>A. Dispnea</p> <p>B. Dolore epigastrico</p> <p>C. Sudorazione algida</p> <p>D. Tutte le risposte sono corrette</p>

6.	<p>Qual è la condotta corretta di fronte a segni di spostamento della sonda nasogastrica?</p> <p>A. Tagliare la sonda e fissare nuovamente</p> <p>B. Se la persona assistita non lamenta dolore è possibile continuare con la somministrazione</p> <p>C. Arrestare la somministrazione e informare immediatamente l'infermiere</p> <p>D. Spingere la sonda più in profondità</p>
7.	<p>La pressione arteriosa è:</p> <p>A. La forza esercitata dal sangue sulle pareti arteriose</p> <p>B. La forza esercitata dal sangue sulle pareti venose</p> <p>C. La forza esercitata dal sangue sulle pareti dei capillari</p> <p>D. La forza esercitata dal sangue sulle pareti dei vasi linfatici</p>
8.	<p>In caso di temperatura corporea elevata, come si modifica la frequenza cardiaca?</p> <p>A. Aumenta</p> <p>B. Diminuisce</p> <p>C. Rimane invariata</p> <p>D. Diventa aritmica</p>
9.	<p>Ad un paziente diabetico l'OSS può consigliare di avere cura dei suoi piedi:</p> <p>A. Lavandoli frequentemente con acqua a temperatura di 40-45 gradi</p> <p>B. Utilizzando calze morbide, senza cuciture e scarpe comode</p> <p>C. Tagliando le unghie molto corte</p> <p>D. Utilizzando scarpe strette</p>
10.	<p>L'OSS lavora utilizzando:</p> <p>A. Solo la comunicazione verbale</p> <p>B. Sia la comunicazione verbale che non verbale</p> <p>C. Isolandosi durante la sua attività</p> <p>D. Altre teorie della comunicazione</p>

11.		<p>Che cosa si intende per posologia:</p> <p>A. Dose di un farmaco</p> <p>B. Modalità e tempi di somministrazione di un farmaco</p> <p>C. Dose, modalità e tempi di somministrazione di un farmaco</p> <p>D. Farmacocinetica</p>
12.		<p>Le preparazioni auricolari vengono applicate:</p> <p>A. Nell'occhio</p> <p>B. Nell'orecchio</p> <p>C. Nel cavo orale</p> <p>D. Sulla cute</p>
13.		<p>Per detersione si intende:</p> <p>A. L'operazione volta alla rimozione meccanica dai substrati di qualsiasi traccia di sporco presente, con acqua e detergente</p> <p>B. L'azione atta a ridurre la carica microbica attraverso l'uso di mezzi chimici</p> <p>C. Il procedimento che, impiegando idonee sostanze chimiche, consente di ridurre il numero dei microrganismi presenti sui tessuti viventi</p> <p>D. L'azione atta a rimuovere le spore la carica microbica attraverso l'uso di mezzi chimici</p>
14.		<p>L'isolamento è:</p> <p>A. Una misura di profilassi delle malattie cardiocircolatorie</p> <p>B. Una misura di profilassi delle malattie infettive</p> <p>C. Una misura di profilassi delle malattie cronico degenerative</p> <p>D. Una misura di profilassi delle malattie infiammatorie</p>
15.		<p>Nella terminologia medica, la desinenza "-ite", indica una patologia di carattere:</p> <p>A. Degenerativo,</p> <p>B. Autoimmune,</p> <p>C. Infiammatorio</p> <p>D. Cronico</p>

16.	<p>Il termine Glucosio è sinonimo di:</p> <ul style="list-style-type: none">A. ZuccheriB. ProtidiC. LipidiD. Vitamine
17.	<p>Quale dei seguenti non è un sintomo tipico dell'ipoglicemia grave?</p> <ul style="list-style-type: none">A. TachicardiaB. Sudorazione notturnaC. PoliuriaD. Alterazione del livello di coscienza
18.	<p>Quale delle seguenti stomie è utilizzata principalmente per l'eliminazione delle feci?</p> <ul style="list-style-type: none">A. ColostomiaB. GastrostomiaC. TracheostomiaD. Ureterostomia
19.	<p>Una dieta povera di residui finalizzata a ridurre il volume e la frequenza delle evacuazioni si classifica come:</p> <ul style="list-style-type: none">A. IperproteicaB. IpoproteicaC. AstringenteD. Lassativa
20.	<p>Quale via di somministrazione farmacologica fornisce l'inizio d'azione più rapido e la disponibilità sistematica immediata?</p> <ul style="list-style-type: none">A. Via oraleB. Via endovenosaC. Via intramuscolareD. Via sottocutanea

21.	<p>Come si definisce la temperatura corporea inferiore a 35°C?</p> <p>A. Ipotermia B. Febbricola C. Ipotermia severa D. Ipertermia</p>
22.	<p>Per eseguire l'aspirazione delle secrezioni orofaringee, quale postazione deve assumere la persona assistita?</p> <p>A. Decubito supino B. Decubito prono C. Posizione semi seduta D. Di Trendelenburg</p>

23.	<p>Elencare tre situazioni specifiche in cui l'operatore deve obbligatoriamente procedere all'igiene delle mani tramite il lavaggio con acqua e sapone detergente, anziché utilizzare la soluzione idroalcolica per frizione.</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
-----	---

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

CORRETTORE PROVA PRATICA A

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di operatore socio sanitario-area degli operatori – ruolo sociosanitario

	Spazio per la risposta corretta	QUESITO
1.	C	<p>Nel caso in cui la persona assistita non sia presente in camera durante la somministrazione delle terapie orali si dovrà:</p> <p>A. Lasciare il farmaco sul comodino</p> <p>B. Lasciare il farmaco in consegna ad un vicino di letto</p> <p>C. Non lasciare il farmaco e cercare il paziente</p> <p>D. Cestinare il farmaco</p>
2.	B	<p>Se, durante l'esecuzione di una medicazione semplice, l'operatore rileva un peggioramento della ferita deve:</p> <p>A. Eseguire la medicazione come prescritto e quando possibile informare il medico</p> <p>B. Informare tempestivamente l'infermiere</p> <p>C. Eseguire la medicazione modificando la prescrizione per favorirne il miglioramento e successivamente informare l'infermiere</p> <p>D. Non deve informare nessuno</p>
3.	D	<p>Nel posizionare in carrozzina una persona assistita collaborante, la prima cosa da fare è:</p> <p>A. Portare nella stanza un sollevatore</p> <p>B. Accertarsi che ci sia un parente o del personale disponibile a sorvegliare la persona assistita</p> <p>C. Rimuovere la terapia endovenosa</p> <p>D. Informare la persona assistita</p>
4.	D	<p>L'emiplegia interessa:</p> <p>A. Solo gli arti superiori</p> <p>B. Solo gli arti inferiori</p> <p>C. Solo un arto</p> <p>D. Due arti della stessa parte del corpo</p>

5.	B	<p>Il pallone Ambu serve a:</p> <p>A. Somministrare l'aerosol terapia</p> <p>B. Ventilare il paziente</p> <p>C. Eseguire esercizi di fisioterapia motoria</p> <p>D. Misurare la frequenza respiratoria</p>
6.	D	<p>In caso di shock ipovolemico il polso della persona assistita si presenta:</p> <p>A. Pieno e frequente</p> <p>B. Pieno e lento</p> <p>C. Aritmico</p> <p>D. Debole, filiforme e frequente</p>
7.	B	<p>Quale tra le seguenti è la complicanza più frequente del diabete?</p> <p>A. Gotta</p> <p>B. Retinopatia</p> <p>C. Ipertiroidismo</p> <p>D. Tachicardia</p>
8.	B	<p>Le vene sono:</p> <p>A. Vasi sanguigni che trasportano il sangue ricco di ossigeno e sostanze nutritive</p> <p>B. Vasi sanguigni che trasportano il sangue ricco di anidride carbonica dalle zone periferiche al cuore</p> <p>C. Vasi sottilissimi che permettono lo scambio di sostanze con in tessuti</p> <p>D. Vasi del sistema linfatico</p>
9.	B	<p>Nella prevenzione delle lesioni da pressione nei soggetti a rischio è necessario cambiare posizione alla persona assistita:</p> <p>A. Solo quando la persona assistita lo richiede</p> <p>B. Almeno ogni 2 o 4 ore o con maggiore frequenza</p> <p>C. Ad ogni cambio turno degli operatori</p> <p>D. Una volta al giorno</p>

		In una persona assistita con la nutrizione enterale per sonda, l'OSS deve prestare attenzione che il sondino sia:
10.	D	<p>A. Ancorato alla cute con idoneo sistema di fissaggio per evitare che si sfili</p> <p>B. Pulito e non occluso</p> <p>C. Ben collegato al sistema di infusione</p> <p>D. Tutte le precedenti affermazioni sono corrette</p>
11.	A	<p>Un farmaco che deve essere mantenuto ad una temperatura compresa tra +2°C e +8°C va riposto:</p> <p>A. In frigorifero</p> <p>B. In congelatore</p> <p>C. In apposito armadio lontano da fonti di calore</p> <p>D. In cassaforte</p>
12.	B	<p>Per dose di un farmaco si intende:</p> <p>A. Il tempo e la modalità di somministrazione</p> <p>B. La quantità di medicamento che bisogna somministrare per ottenere un effetto curativo</p> <p>C. La forma farmaceutica</p> <p>D. La via di somministrazione</p>
13.	A	<p>Si definisce contaminazione:</p> <p>A. La presenza occasionale e transitoria di microrganismi su una superficie</p> <p>B. La presenza e la moltiplicazione di un microrganismo solo nel sangue</p> <p>C. La presenza e la moltiplicazione di microrganismi solo nelle vie urinarie</p> <p>D. La presenza e la moltiplicazione di microrganismi solo nelle vie respiratorie</p>
14.	C	<p>In quali contenitori vanno smaltiti gli strumenti taglienti e pungenti?</p> <p>A. Nei contenitori per rifiuti indifferenziati</p> <p>B. Nei contenitori per materiale infetto</p> <p>C. Nei contenitori di plastica rigida, resistenti alla puntura, per rifiuti sanitari speciali</p> <p>D. Nei contenitori per la raccolta della plastica e imballaggi</p>

15.	A	<p>La definizione di emottisi è:</p> <p>A. Emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse</p> <p>B. Emissione di sangue dal cavo orale</p> <p>C. Emissione di sangue dalle feci</p> <p>D. Emissione di sangue dalle urine</p>
16.	A	<p>Con il termine pollachiuria si intende:</p> <p>A. L'elevata frequenza delle minzioni</p> <p>B. L'eccessiva quantità di urina prodotta</p> <p>C. La perdita involontaria di urina</p> <p>D. La perdita involontaria di feci</p>
17.	C	<p>La procedura di disinfezione consiste in:</p> <p>A. Procedimenti ed operazioni di ordine pratico e sanitario atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia e di detersione</p> <p>B. Un complesso di procedimenti e di operazioni atti a rimuovere ed asportare rifiuti, polveri e sporco di qualsiasi natura delle superfici e degli ambienti</p> <p>C. Un processo che si propone di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni, o potenzialmente patogeni, ad eccezione delle spore, mediante l'applicazione di agenti fisici o chimici (ad es. calore, disinfettanti)</p> <p>D. Un processo che si propone di eliminare completamente le spore, mediante l'applicazione di alte temperature</p>
18.	A	<p>Quale stadio di una lesione da pressione è caratterizzato da un eritema non sbiancante su cute integra?</p> <p>A. Stadio I</p> <p>B. Stadio II</p> <p>C. Categoria di sospetta lesione dei tessuti profondi</p> <p>D. Lesione non stadiabile</p>
19.	A	<p>Quale delle seguenti vie di misurazione della temperatura fornisce in genere i valori più alti tra le opzioni proposte?</p> <p>A. Rettale</p> <p>B. Ottica</p> <p>C. Orale</p> <p>D. Ascellare</p>

20.	C	<p>Qual è l'azione prioritaria quando le mani sono visibilmente sporche?</p> <p>A. Frizione alcolica per 20-30 secondi fino ad evaporazione</p> <p>B. Indossare i guanti e rinviare l'igiene a fine procedura</p> <p>C. Lavaggio con acqua e sapone per 40-60 secondi, poi asciugatura</p> <p>D. Solo risciacquo rapido sotto acqua corrente</p>
21.	B	<p>Nel protocollo di igiene del corpo di una persona assistita con mobilità ridotta, quale sequenza è considerata più adeguata?</p> <p>A. Dalle zone distali a quelle prossimali</p> <p>B. Dalle zone meno contaminate a quelle più contaminate</p> <p>C. Prima arti superiori poi arti inferiori</p> <p>D. Prima la parte anteriore del corpo poi quella posteriore</p>
22.	B	<p>Un adulto riferisce dolore toracico improvviso e dispnea. Qual è la condotta corretta?</p> <p>A. Somministrare bevande calde e attendere</p> <p>B. Attivare immediatamente i soccorsi, far riposare in posizione semi seduta e monitorare</p> <p>C. Incoraggiare una camminata</p> <p>D. Dare analgesici senza indicazione</p>

23.	<p>Completi la tabella seguente con le sedi in cui vengono posizionate le derivazioni periferiche durante la registrazione dell'Elettrocardiogramma.</p> <p>(Punti 1.5 per ogni affermazione corretta)</p>	
	ELETTRODO ROSSO	POLSO/ BRACCIO/ARTO SUPERIORE DX
	ELETTRODO NERO	CAVIGLIA/ GAMBA/ ARTO INFERIORE DX
	ELETTRODO GIALLO	POLSO/ BRACCIO/ARTO SUPERIORE SX
	ELETTRODO VERDE	CAVIGLIA/ GAMBA/ ARTO INFERIORE SX

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

CORRETTORE PROVA PRATICA B

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di operatore socio sanitario-area degli operatori – ruolo sociosanitario

	Spazio per la risposta corretta	QUESITO
1.	A	<p>Quali fattori fisiologici possono aumentare il rischio di accumulo di farmaci nell'organismo?</p> <p>A. Insufficienza renale e alterazione della funzione epatica B. Presenza di vomito persistente C. Diminuzione del legame alle proteine plasmatiche D. Aumento della motilità intestinale</p>
2.	C	<p>Quali cibi sono da evitare in persone con ipertensione arteriosa?</p> <p>A. Cibi contenenti glutine B. Cibi iper-proteici C. Alimenti troppo salati D. Non ci sono indicazioni specifiche</p>
3.	B	<p>Per eseguire correttamente l'aerosol terapia è necessario:</p> <p>A. Posizionare la persona assistita in posizione sdraiata e somministrare subito dopo i pasti B. Posizionare la persona assistita in posizione seduta e somministrare lontano dai pasti C. Posizionare la persona assistita in posizione seduta e somministrare in qualsiasi momento della giornata D. Non ci sono indicazioni specifiche</p>
4.	A	<p>Una persona assistita con lesione da pressione a livello sacrale, quando è a letto deve:</p> <p>A. Cambiare posizione ogni due quattro ore o con maggiore frequenza B. Rimanere sempre supino C. Deve alternare tutte le posizioni, compresa quella supina D. Cambiare posizione una volta per turno</p>

5.	C	<p>Qual è l'intervento prioritario che l'OSS deve attuare durante una crisi epilettica di tipo "Grande Male" (tonico-clonica) mentre il paziente è a terra?</p> <p>A. Iniziare le manovre di rianimazione</p> <p>B. Cercare di immobilizzare gli arti del paziente con forza per bloccare le convulsioni e prevenire fratture</p> <p>C. Proteggere il capo del paziente da urti accidentali e allontanare oggetti pericolosi circostanti</p> <p>D. Somministrare acqua o farmaci per via orale non appena iniziano i primi movimenti convulsivi</p>
6.	B	<p>Nel contesto del Pronto Soccorso, che cosa si intende correttamente per "Triage"?</p> <p>A. Il trattamento farmacologico immediato somministrato dall'OSS per stabilizzare il paziente critico</p> <p>B. Il processo di accoglienza e classificazione dei pazienti in base alla gravità delle loro condizioni e all'urgenza delle cure, non in base all'ordine di arrivo</p> <p>C. La dimissione protetta del paziente verso strutture di lungodegenza o assistenza domiciliare</p> <p>D. Una tecnica di primo soccorso utilizzata esclusivamente in caso di ostruzione totale delle vie aeree da corpo estraneo</p>
7.	A	<p>Che cos'è una colostomia?</p> <p>A. Un'apertura della parete intestinale che raccorda il tratto intestinale del colon con l'esterno</p> <p>B. Un sistema di nutrizione artificiale</p> <p>C. Un'apertura nella parete addominale per consentire l'alimentazione</p> <p>D. Una metodica diagnostica</p>
8.	B	<p>L'ossigeno nel sangue viene trasportato legato a:</p> <p>A. Globuli bianchi</p> <p>B. Emoglobina</p> <p>C. Piastrine</p> <p>D. Anticorpi</p>

		Indica quale tecnica si utilizza nella rilevazione della Pressione Arteriosa con lo sfigmomanometro:
9.	A	<p>A. Metodo palpatorio e ascoltatorio</p> <p>B. Metodo cruento</p> <p>C. Metodo endoscopico</p> <p>D. Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta</p>
10.	B	<p>La coltura microbiologica di un campione fecale per identificare patogeni intestinali si chiama:</p> <p>A. Urocoltura</p> <p>B. Coprocoltura</p> <p>C. Emocoltura</p> <p>D. Mielocoltura</p>
11.	C	<p>Per preparato galenico si intende:</p> <p>A. Un farmaco in fiale e iniettabile in vena</p> <p>B. Un farmaco in compresse non divisibili</p> <p>C. Un farmaco personalizzato realizzato dal farmacista in laboratorio</p> <p>D. Un alimento sostitutivo</p>
12.	A	<p>Cosa bisogna fare quando in reparto scade un farmaco?</p> <p>A. Togliere il farmaco dall'armadio farmaceutico evidenziarlo con la dicitura "scaduti da non utilizzare", in attesa di renderli alla Farmacia</p> <p>B. Togliere il farmaco dall'armadio farmaceutico e smaltirlo nell'Halipak</p> <p>C. Togliere il farmaco dall'armadio farmaceutico e smaltirlo con i rifiuti solidi urbani</p> <p>D. Utilizzarlo indifferentemente dalla data di scadenza</p>
13.	C	<p>La disinfezione è:</p> <p>A. L'insieme delle misure attuate al fine di eliminare tutti i microrganismi viventi</p> <p>B. L'insieme delle misure attuate al fine di eliminare solo alcuni microrganismi presenti nell'ambiente</p> <p>C. L'insieme delle misure attuate al fine di ridurre, a un livello di "sicurezza", il numero dei microrganismi capaci di provocare malattia, presenti su una superficie o nell'ambiente</p> <p>D. L'insieme delle misure attuate al fine di garantire la sterilità dello strumentario chirurgico</p>

14.	D	<p>Dopo la rimozione dei guanti le mani devono essere igienizzate, perché?</p> <p>A. Sotto i guanti i microbi si moltiplicano</p> <p>B. I microbi possono passare sulle mani attraverso micro fori</p> <p>C. È presente il rischio di contaminazione delle mani durante le manovre di rimozione dei guanti</p> <p>D. Tutte le precedenti risposte sono corrette</p>
15.	C	<p>Che cosa indica il termine stranguria?</p> <p>A. Difficoltà alla minzione</p> <p>B. Insufficienza funzionale dello sfintere uretrale</p> <p>C. Dolore che segue o accompagna la minzione</p> <p>D. L'elevata frequenza delle minzioni</p>
16.	A	<p>Un paziente con difficoltà respiratorie si definisce:</p> <p>A. Dispnoico</p> <p>B. Cirrotico</p> <p>C. Iperteso</p> <p>D. Eupnoico</p>
17.	B	<p>Qual è la pratica corretta per l'igiene orale in persona allettata con rischio di inalazione involontaria di materiale orofaringeo o gastrico?</p> <p>A. Usare grandi quantità di acqua senza aspirazione</p> <p>B. Spazzolare con piccole quantità di acqua, aspirare, se disponibile un sistema di aspirazione, e posizionare in decubito laterale o semi seduto</p> <p>C. Evitare l'igiene per ridurre i rischi</p> <p>D. Usare solo collutorio concentrato</p>
18.	A	<p>Quale stadio di una lesione da pressione è caratterizzato da un eritema non sbiancante su cute integra?</p> <p>A. Stadio I</p> <p>B. Stadio II</p> <p>C. Categoria di sospetta lesione dei tessuti profondi</p> <p>D. Lesione non stadiabile</p>

		Quale delle seguenti vie di misurazione della temperatura fornisce in genere i valori più alti tra le opzioni proposte?
19.	A	<p>A. Rettale</p> <p>B. Ottica</p> <p>C. Orale</p> <p>D. Ascellare</p>
20.	C	<p>Qual è l'azione prioritaria quando le mani sono visibilmente sporche?</p> <p>A. Frizione alcolica per 20-30 secondi fino ad evaporazione</p> <p>B. Indossare i guanti e rinviare l'igiene a fine procedura</p> <p>C. Lavaggio con acqua e sapone per 40-60 secondi, poi asciugatura</p> <p>D. Solo risciacquo rapido sotto acqua corrente</p>
21.	B	<p>Nel protocollo di igiene del corpo di una persona assistita con mobilità ridotta, quale sequenza è considerata più adeguata?</p> <p>A. Dalle zone distali a quelle prossimali</p> <p>B. Dalle zone meno contaminate a quelle più contaminate</p> <p>C. Prima arti superiori poi arti inferiori</p> <p>D. Prima la parte anteriore del corpo poi quella posteriore</p>
22.	B	<p>Un adulto riferisce dolore toracico improvviso e dispnea. Qual è la condotta corretta?</p> <p>A. Somministrare bevande calde e attendere</p> <p>B. Attivare immediatamente i soccorsi, far riposare in posizione semi seduta e monitorare</p> <p>C. Incoraggiare una camminata</p> <p>D. Dare analgesici senza indicazione</p>

23.	<p>Elencare tre diversi tipi di lavaggio delle mani.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavaggio sociale, - Lavaggio antisettico, - Strofinamento alcolico, - Lavaggio chirurgico. <p>(2 punti per ogni affermazione corretta, max 6 punti)</p>
-----	--

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

CORRETTORE PROVA PRATICA C

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di operatore socio sanitario-area degli operatori – ruolo sociosanitario

	Spazio per la risposta corretta	QUESITO
1.	A	<p>La prevenzione delle lesioni da pressione si attua:</p> <p>A. Adottando una mobilitazione programmata e presidi antidecubito</p> <p>B. Lasciando la persona assistita nella posizione preferita</p> <p>C. Adottando i presidi antidecubito, ma senza mobilitare la persona assistita</p> <p>D. Massaggiando energicamente la cute se arrossata</p>
2.	B	<p>Nel caso di broncopolmonite febbrile è necessario che la persona assistita:</p> <p>A. Resti immobile nel letto per tutta la durata del ricovero</p> <p>B. Venga stimolata ad idratarsi e al cambio di postura</p> <p>C. Venga sottoposta ad un percorso riabilitativo</p> <p>D. Indossi la maschera di Venturi</p>
3.	D	<p>Nel trattamento della stipsi si consiglia una dieta:</p> <p>A. Ricca di lipidi</p> <p>B. Povera di zuccheri</p> <p>C. Ricca di proteine</p> <p>D. Ricca di fibre</p>
4.	B	<p>In una persona assistita con diuresi spontanea quale presidio si deve utilizzare per la raccolta delle urine nelle 24 ore?</p> <p>A. Una sacca sterile con valvola anti reflusso</p> <p>B. Un bidoncino di capacità uguale o superiore ai 2000 ml.</p> <p>C. Una sacca sterile da 1000 ml.</p> <p>D. Nessuna delle precedenti risposte è corretta</p>
5.	C	<p>Quando è necessario intervenire con la manovra di Heimlich?</p> <p>A. Durante il sollevamento della persona assistita con ausili meccanici</p> <p>B. Durante lo svuotamento di drenaggi a caduta</p> <p>C. In caso di ostruzione delle vie aeree</p> <p>D. In caso di ostruzione del sondino nasogastrico</p>

6.	A	<p>Abitualmente come deve essere posizionato una persona adulta incosciente, che respira spontaneamente, e che vomita?</p> <p>A. Con la testa ruotata di lato</p> <p>B. Con le gambe della persona sollevate per favorire l'afflusso di sangue al cervello</p> <p>C. Supino</p> <p>D. In ortostasi</p>
7.	B	<p>Per rilevare lo stato di disidratazione di un paziente si controlla:</p> <p>A. La temperatura corporea</p> <p>B. La cute e le mucose</p> <p>C. Il numero di atti respiratori</p> <p>D. La glicemia</p>
8.	A	<p>L'apparato scheletrico è formato da:</p> <p>A. Ossa- articolazioni</p> <p>B. Tessuti- cartilagini</p> <p>C. Muscoli- articolazioni</p> <p>D. Muscoli- cartilagini</p>
9.	A	<p>Dopo aver eseguito il cambio di una medicazione semplice l'operatore deve:</p> <p>A. Riordinare e smaltire correttamente il materiale usato</p> <p>B. Aprire le finestre per areare il locale</p> <p>C. Procedere con il rifacimento del letto</p> <p>D. Procedere con l'igiene del paziente</p>
10.	C	<p>Indica, tra questi, i valori normali della glicemia in una persona adulta.</p> <p>A. Tra 160 e 90 mg/dl</p> <p>B. Tra 40 e 90 mg/dl</p> <p>C. Tra 80 e 110 mg/dl</p> <p>D. Tra 100 e 200 mg/dl</p>
11.	B	<p>La pomata oftalmica viene applicata:</p> <p>A. Nel padiglione auricolare</p> <p>B. Nell'occhio</p> <p>C. In bocca</p> <p>D. Sulle scottature</p>

		L'alimentazione parenterale viene somministrata per via:
12.	A	<p>A. Venosa</p> <p>B. Arteriosa</p> <p>C. Per via orale</p> <p>D. Tramite sonda naso gastrica</p>
13.	D	<p>Quali dei seguenti fattori possono influenzare l'attività di un disinfettante?</p> <p>A. La concentrazione</p> <p>B. La temperatura</p> <p>C. Il corretto tempo di applicazione</p> <p>D. Tutte le risposte precedenti sono corrette</p>
14.	B	<p>Che cosa si intende per precauzioni standard:</p> <p>A. L'insieme dei comportamenti che devono essere rispettati solo da alcuni operatori sanitari</p> <p>B. Un insieme di norme finalizzate ad evitare la diffusione e/o la trasmissione di infezioni in ambiente ospedaliero sia da fonti note che da fonti ignote</p> <p>C. L'insieme dei comportamenti che devono essere rispettati solo dal personale che lavora al Pronto Soccorso</p> <p>D. L'insieme dei comportamenti che devono essere rispettati per garantire la sterilità in sala operatori</p>
15.	C	<p>Cosa si intende per melena?</p> <p>A. Feci normoformate</p> <p>B. Feci liquide</p> <p>C. Feci scure maleodoranti</p> <p>D. Feci bianche</p>
16.	A	<p>Cosa significa disfagia?</p> <p>A. Deglutizione difficoltosa</p> <p>B. Articolazione difficile della parola</p> <p>C. Impossibilità assoluta al passaggio del cibo nell'esofago</p> <p>D. Andatura incerta</p>

17.	C	<p>La procedura di disinfezione consiste in:</p> <p>A. Procedimenti ed operazioni di ordine pratico e sanitario atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia e di detersione</p> <p>B. Un complesso di procedimenti e di operazioni atti a rimuovere ed asportare, rifiuti, polveri e sporco di qualsiasi natura delle superfici e degli ambienti</p> <p>C. Un processo che si propone di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni, o potenzialmente patogeni, ad eccezione delle spore, mediante l'applicazione di agenti fisici o chimici (ad es. calore, disinfettanti)</p> <p>D. Un processo che si propone di eliminare la maggior parte delle spore, mediante l'applicazione di alte temperature</p>
18.	A	<p>Quale stadio di una lesione da pressione è caratterizzato da un eritema non sbiancante su cute integra?</p> <p>A. Stadio I</p> <p>B. Stadio II</p> <p>C. Categoria di sospetta lesione dei tessuti profondi</p> <p>D. Lesione non stadiabile</p>
19.	A	<p>Quale delle seguenti vie di misurazione della temperatura fornisce in genere i valori più alti tra le opzioni proposte?</p> <p>A. Rettale</p> <p>B. Ottica</p> <p>C. Orale</p> <p>D. Ascellare</p>
20.	C	<p>Qual è l'azione prioritaria quando le mani sono visibilmente sporche?</p> <p>A. Frizione alcolica per 20-30 secondi fino ad evaporazione</p> <p>B. Indossare i guanti e rinviare l'igiene a fine procedura</p> <p>C. Lavaggio con acqua e sapone per 40-60 secondi, poi asciugatura</p> <p>D. Solo risciacquo rapido sotto acqua corrente</p>

		Nel protocollo di igiene del corpo di una persona assistita con mobilità ridotta,
21.	B	<p>quale sequenza è considerata più adeguata?</p> <p>A. Dalle zone distali a quelle prossimali</p> <p>B. Dalle zone meno contaminate a quelle più contaminate</p> <p>C. Prima arti superiori poi arti inferiori</p> <p>D. Prima la parte anteriore del corpo poi quella posteriore</p>
22.	B	<p>Un adulto riferisce dolore toracico improvviso e dispnea. Qual è la condotta corretta?</p> <p>A. Somministrare bevande calde e attendere</p> <p>B. Attivare immediatamente i soccorsi, far riposare in posizione semi seduta e monitorare</p> <p>C. Incoraggiare una camminata</p> <p>D. Dare analgesici senza indicazione</p>

23.		<p>Esecuzione dell'Elettrocardiogramma: abbinare il giusto elettrodo periferico alla posizione sotto in cui si deve applicare</p> <ul style="list-style-type: none"> • V1: Quarto spazio intercostale, a destra dello sterno. • V2: Quarto spazio intercostale, a sinistra dello sterno. • V3: A metà strada tra V2 e V4. • V4: Quinto spazio intercostale, sulla linea emiclaveare. • V5: Sulla linea ascellare anteriore, allo stesso livello orizzontale di V4. • V6: Sulla linea ascellare media, allo stesso livello orizzontale di V4 e V5. <p>(Punti 1 per ogni affermazione corretta)</p>
-----	--	--

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

CORRETTORE PROVA PRATICA D

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di operatore socio sanitario-area degli operatori – ruolo sociosanitario

	Spazio per la risposta corretta	QUESITO
1.	B	<p>Qual è la procedura corretta che l'OSS deve seguire (o indicare al paziente) per la raccolta di un campione di urina destinato all'urinocoltura?</p> <p>A. Raccogliere l'intera quantità della prima minzione del mattino in un contenitore non sterile</p> <p>B. Effettuare un'accurata igiene dei genitali esterni, scartare il primo getto di urina e raccogliere il "mitto intermedio" in un contenitore sterile</p> <p>C. Raccogliere le urine della sacca di un paziente portatore di catetere vescicale a permanenza dopo averle lasciate ristagnare per 2 ore</p> <p>D. Raccogliere il campione in qualsiasi momento della giornata senza necessità di igiene preventiva, purché il contenitore sia ben chiuso</p>
2.	D	<p>Indicare quali possono essere le possibili complicanze della terapia endovenosa.</p> <p>A. Stravaso</p> <p>B. Flebiti</p> <p>C. Infezioni</p> <p>D. Tutte le risposte sono corrette</p>
3.	A	<p>La vestizione della persona con apparecchio gessato ad un arto va eseguita:</p> <p>A. Infilando prima l'arto con apparecchio gessato</p> <p>B. Infilando prima l'arto libero da apparecchio gessato</p> <p>C. È indifferente quale arto infilare per primo</p> <p>D. Lasciando svestito l'arto con apparecchio gessato</p>
4.	B	<p>Quando una persona assistita allettata presenta nausea ed è in procinto di vomitare, abitualmente come deve essere posizionata per prevenire complicanze?</p> <p>A. Posizione supina con la testa leggermente arretrata per favorire la fuoriuscita del vomito</p> <p>B. Posizione laterale di sicurezza</p> <p>C. Posizione di Trendelenburg</p> <p>D. La posizione è indifferente nella prevenzione delle complicanze</p>

5.	A	<p>La posizione di Trendelenburg è:</p> <p>A. Una posizione con la testa più bassa rispetto alle gambe</p> <p>B. Una posizione semi seduta con gambe flesse</p> <p>C. Una posizione con la testa più alta rispetto alle gambe</p> <p>D. Una posizione supina in cui la posizione delle gambe e della testa sono alla stessa altezza</p>
6.	C	<p>In un paziente diabetico è importante controllare:</p> <p>A. I denti per il rischio carie</p> <p>B. Le mucose per il rischio anemia</p> <p>C. I piedi per il rischio di lesioni</p> <p>D. L'andatura per il rischio cadute</p>
7.	C	<p>I capillari sono:</p> <p>A. Vasi sanguigni che trasportano il sangue ricco di ossigeno e sostanze nutritive</p> <p>B. Vasi sanguigni che trasportano il sangue ricco di anidride carbonica dalle zone periferiche al cuore</p> <p>C. Vasi sottilissimi che permettono lo scambio di sostanze con in tessuti</p> <p>D. Vasi di grosso calibro</p>
8.	A	<p>Indicare l'esatta tecnica per effettuare la disinfezione della ferita in una medicazione chirurgica non settica.</p> <p>A. Procedere alla disinfezione della ferita dal centro alla periferia</p> <p>B. Procedere alla disinfezione della ferita dalla periferia al centro</p> <p>C. Procedere alla disinfezione della ferita in senso lineare</p> <p>D. Non esiste una indicazione specifica</p>
9.	C	<p>Durante l'esecuzione di un microclisma la postura corretta che la persona deve tenere è:</p> <p>A. Supina</p> <p>B. Sul fianco destro con la gamba sinistra flessa</p> <p>C. Sul fianco sinistro con la gamba destra flessa</p> <p>D. Prona</p>

		I collutori vengono usati:
10.	A	<p>A. Nell'igiene del cavo orale</p> <p>B. Per l'aerosolterapia</p> <p>C. Per idratare la pelle</p> <p>D. Per detergere il viso</p>
11.	A	<p>Il serbatoio degli umidificatori nell'ossigenoterapia è riempito con:</p> <p>A. Acqua sterile</p> <p>B. Acqua corrente</p> <p>C. Acqua minerale</p> <p>D. Acqua povera di residuo fisso</p>
12.	D	<p>Secondo la classificazione internazionale delle lesioni da pressione, una lesione con perdita totale dello spessore cutaneo con esteso danno tissutale, necrosi o interessamento di muscolo, osso o strutture di sostegno corrisponde a:</p> <p>A. Grado I</p> <p>B. Grado II</p> <p>C. Grado III</p> <p>D. Grado IV</p>
13.	B	<p>Quale effetto si cerca di generare con la manovra di Heimlich in un adulto cosciente con ostruzione delle vie aeree?</p> <p>A. Provocare il vomito per espellere il corpo estraneo</p> <p>B. Generare una tosse artificiale per espellere il corpo estraneo</p> <p>C. Indurre uno spasmo laringeo protettivo</p> <p>D. Provocare dolore per stimolare la respirazione profonda</p>
14.	C	<p>Per tachicardia si intende:</p> <p>A. Aumento della frequenza respiratoria</p> <p>B. Diminuzione della frequenza cardiaca</p> <p>C. Aumento della frequenza cardiaca</p> <p>D. Diminuzione della frequenza respiratoria</p>

15.	C	<p>Con il termine profilassi s'intende:</p> <p>A. L'insieme delle misure volte ad impedire fenomeni di assenteismo</p> <p>B. L'insieme delle prestazioni mediche ed infermieristiche domiciliari</p> <p>C. L'insieme delle misure volte a prevenire l'insorgenza e la diffusione delle malattie</p> <p>D. L'insieme delle misure antincendio</p>
16.	C	<p>Qual è la condotta corretta di fronte a segni di spostamento della sonda nasogastrica?</p> <p>A. Tagliare la sonda e fissare nuovamente</p> <p>B. Se la persona assistita non lamenta dolore è possibile continuare con la somministrazione</p> <p>C. Arrestare la somministrazione e informare immediatamente l'infermiere</p> <p>D. Spingere la sonda più in profondità</p>
17.	D	<p>Quale dei seguenti non è un sintomo tipico dell'ipoglicemia grave?</p> <p>A. Tachicardia</p> <p>B. Sudorazione notturna</p> <p>C. Poliuria</p> <p>D. Alterazione del livello di coscienza</p>
18.	A	<p>Quale delle seguenti stomie è utilizzata principalmente per l'eliminazione delle feci?</p> <p>A. Colostomia</p> <p>B. Gastrostomia</p> <p>C. Tracheostomia</p> <p>D. Ureterostomia</p>
19.	C	<p>Una dieta povera di residui finalizzata a ridurre il volume e la frequenza delle evacuazioni si classifica come:</p> <p>A. Iperproteica</p> <p>B. Ipoproteica</p> <p>C. Astringente</p> <p>D. Lassativa</p>

		Quale via di somministrazione farmacologica fornisce l'inizio d'azione più rapido e la disponibilità sistematica immediata?
20.	B	<p>A. Via orale</p> <p>B. Via endovenosa</p> <p>C. Via intramuscolare</p> <p>D. Via sottocutanea</p>
21.	A	<p>Come si definisce la temperatura corporea inferiore a 35°C?</p> <p>A. Ipotermia</p> <p>B. Febbricola</p> <p>C. Ipotermia severa</p> <p>D. Ipertermia</p>
22.	C	<p>Per eseguire l'aspirazione delle secrezioni orofaringee, quale posizione deve assumere la persona assistita?</p> <p>A. Decubito supino</p> <p>B. Decubito prono</p> <p>C. Posizione semi seduta</p> <p>D. Di Trendelenburg</p>

23.	<p>Elencare tre azioni da mettere in atto in caso di persona assistita con temperatura corporea elevata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coprire durante il brivido, - scoprire il paziente al termine del brivido, - su indicazione applicare ghiaccio a livello del passaggio di grossi vasi sanguigni, - monitorare l'andamento della temperatura. - Idratare <p>(2 punti per ogni affermazione corretta)</p>
-----	---

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

CORRETTORE PROVA PRATICA E

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di operatore socio sanitario-area degli operatori – ruolo sociosanitario

	Spazio per la risposta corretta	QUESITO
1.	C	<p>Occorre avere particolare attenzione con il materiale sterilizzato perché:</p> <p>A. Si può utilizzare entro e non oltre 3 giorni</p> <p>B. Si può utilizzare entro e non oltre una settimana</p> <p>C. Va aperto solo al momento dell'utilizzo e non oltre la data di scadenza che ne garantisce la sterilità</p> <p>D. Tutte le risposte precedenti sono corrette</p>
2.	C	<p>Per comunicare con le persone ipoacusiche occorre:</p> <p>A. Parlare sempre a voce alta</p> <p>B. Parlare vicino all'orecchio</p> <p>C. Parlare lentamente ponendosi di fronte alla persona</p> <p>D. Parlare velocemente</p>
3.	C	<p>Nel rifacimento del letto occupato da paziente non autosufficiente bisogna:</p> <p>A. Lasciare la persona assistita in posizione supina e procedere al rifacimento del letto dall'alto verso il basso</p> <p>B. Lasciare la persona assistita in posizione supina e arrotolare la biancheria pulita sotto la schiena</p> <p>C. Girare la persona assistita di lato, arrotolare la biancheria sporca sotto la schiena del paziente, stendere la biancheria pulita nella parte di materasso rimasta libera</p> <p>D. Mettere la persona assistita prona e stendere la biancheria pulita</p>
4.	B	<p>Quando una persona assistita allettata presenta nausea ed è in procinto di vomitare, abitualmente come deve essere posizionata per prevenire complicanze?</p> <p>A. Posizione supina con la testa leggermente arretrata per favorire la fuoriuscita del vomito</p> <p>B. Posizione laterale di sicurezza</p> <p>C. Posizione di Trendelenburg</p> <p>D. La posizione è indifferente nella prevenzione delle complicanze</p>

5.	D	<p>Di fronte ad una crisi epilettica il primo soccorritore deve:</p> <p>A. Accompagnare a terra la persona</p> <p>B. Allontanare dalla persona tutti gli oggetti contundenti</p> <p>C. Evitare che la persona si morda la lingua</p> <p>D. Tutte le risposte precedenti sono corrette</p>
6.	B	<p>Come prestare soccorso ad un soggetto in stato di shock?</p> <p>A. Dargli da bere acqua e zucchero ed effettuare la respirazione artificiale</p> <p>B. Stenderlo e coprirlo con una coperta</p> <p>C. Effettuare il massaggio cardiaco</p> <p>D. Effettuare la manovra di Heimlich</p>
7.	A	<p>Le arterie sono:</p> <p>A. Vasi che conducono il sangue ossigenato dal cuore alla periferia</p> <p>B. Vasi che conducono il sangue solo verso la parte alta del corpo</p> <p>C. Vasi che conducono il sangue ossigenato dalla periferia al cuore</p> <p>D. Vasi del sistema linfatico</p>
8.	A	<p>Nei pazienti diabetici:</p> <p>A. La glicemia ha tendenzialmente valori alti</p> <p>B. La creatinina si alza</p> <p>C. La glicemia è bassa</p> <p>D. La pressione arteriosa è bassa</p>
9.	B	<p>Tra le seguenti, quali sono le sedi corrette per la rilevazione della temperatura corporea:</p> <p>A. Auricolare, ascellare, interdigitale, orale, rettale</p> <p>B. Auricolare, ascellare, orale, rettale</p> <p>C. Auricolare, ascellare, malleolare, orale, rettale</p> <p>D. Auricolare, oculare, malleolare, orale, rettale</p>
10.	B	<p>L'ossigeno durante la somministrazione deve essere sempre:</p> <p>A. Raffreddato</p> <p>B. Umidificato</p> <p>C. Nebulizzato</p> <p>D. Tutte le precedenti risposte sono corrette</p>

11.	C	<p>In quale delle seguenti situazioni cliniche è assolutamente controindicato il clistere di pulizia?</p> <p>A. Persona assistita con stipsi cronica B. Preparazione alla colonscopia C. Persona assistita con sospetta perforazione intestinale D. Prima di un intervento di chirurgia addominale</p>
12.	B	<p>Nell'igiene della persona assistita allettata, qual è il principio fondamentale che giustifica l'ordine con cui si lavano le diverse parti del corpo?</p> <p>A. Facilitare l'asciugatura delle aree lavate B. Procedere dalle aree più pulite a quelle contaminate C. Minimizzare i tempi D. Comodità dell'operatore sanitario</p>
13.	B	<p>La procedura di decontaminazione è necessaria:</p> <p>A. Solo nel caso di contaminazione di piccole quantità di materiale organico B. Sempre nel caso di contaminazione di materiale organico C. Solo nel caso di contaminazione con sostanza chimiche D. Solo nel caso di contaminazione di alimenti</p>
14.	C	<p>La via più frequente di trasmissione dei microorganismi in ospedale è:</p> <p>A. L'Acqua B. L'Aria C. Le mani D. Gli alimenti confezionati</p>
15.	A	<p>La diminuzione della frequenza cardiaca si definisce:</p> <p>A. Bradicardia B. Aritmia C. Apnea D. Tachicardia</p>

16.	C	<p>Qual è la condotta corretta di fronte a segni di spostamento della sonda nasogastrica?</p> <p>A. Tagliare la sonda e fissare nuovamente</p> <p>B. Se la persona assistita non lamenta dolore è possibile continuare con la somministrazione</p> <p>C. Arrestare la somministrazione e informare immediatamente l'infermiere</p> <p>D. Spingere la sonda più in profondità</p>
17.	D	<p>Quale dei seguenti non è un sintomo tipico dell'ipoglicemia grave?</p> <p>A. Tachicardia</p> <p>B. Sudorazione notturna</p> <p>C. Poliuria</p> <p>D. Alterazione del livello di coscienza</p>
18.	A	<p>Quale delle seguenti stomie è utilizzata principalmente per l'eliminazione delle feci?</p> <p>A. Colostomia</p> <p>B. Gastrostomia</p> <p>C. Tracheostomia</p> <p>D. Ureterostomia</p>
19.	C	<p>Una dieta povera di residui finalizzata a ridurre il volume e la frequenza delle evacuazioni si classifica come:</p> <p>A. Iperproteica</p> <p>B. Ipoproteica</p> <p>C. Astringente</p> <p>D. Lassativa</p>
20.	B	<p>Quale via di somministrazione farmacologica fornisce l'inizio d'azione più rapido e la disponibilità sistematica immediata?</p> <p>A. Via orale</p> <p>B. Via endovenosa</p> <p>C. Via intramuscolare</p> <p>D. Via sottocutanea</p>

		Come si definisce la temperatura corporea inferiore a 35°C?
21.	A	<p>A. Ipotermia</p> <p>B. Febbricola</p> <p>C. Ipotermia severa</p> <p>D. Ipertermia</p>
22.	C	<p>Per eseguire l'aspirazione delle secrezioni orofaringee, quale postazione deve assumere la persona assistita?</p> <p>A. Decubito supino</p> <p>B. Decubito prono</p> <p>C. Posizione semi seduta</p> <p>D. Trendelemburg</p>

23.	<p>In caso di riscontro casuale di persona assistita in apparente stato di incoscienza, con parametri vitali conservati, elencare 3 azioni mettere in atto?</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Chiamarlo per nome</i> - <i>Chiamare l'infermiere, i soccorsi o il medico</i> - <i>Mettere in sicurezza</i> - <i>Mettere in posizione di sicurezza in caso di emesi</i> - <i>Pizzicare una zona del corpo sensibile</i> - <i>Utilizzare la Scale (VPU, GCS)</i> - <p>(2 punti per ogni affermazione corretta, max 6 punti)</p>	
-----	--	--

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

CORRETTORE PROVA PRATICA F

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di operatore socio sanitario-area degli operatori – ruolo sociosanitario

	Spazio per la risposta	QUESITO
	corretta	
1.	C	<p>Quando una persona è portatrice di sondino naso gastrico come viene eseguita l'igiene del naso?</p> <p>A. Si pulisce la cute con manovre asettiche e materiale sterile</p> <p>B. Si pulisce la cute con abbondante acqua e sapone</p> <p>C. Si pulisce la cute con movimenti delicati e, se necessario, si rinnova il cerotto di fissaggio del sondino</p> <p>D. Si sfila il sondino nasogastrico per permettere una migliore igiene</p>
2.	B	<p>Cosa si osserva in occasione della comparsa di una lesione da pressione al primo stadio di sviluppo?</p> <p>A. Necrosi tissutale</p> <p>B. Arrossamento della cute</p> <p>C. Lesione di continuo della cute e del sottocute</p> <p>D. Lesione sottocutanea</p>
3.	B	<p>In una persona portatrice di catetere a permanenza si deve:</p> <p>A. Eseguire l'igiene dei genitali con manovra asettica</p> <p>B. Eseguire l'igiene dei genitali con particolare attenzione al meato urinario</p> <p>C. Eseguire l'igiene dei genitali con particolare attenzione alla sacca di raccolta delle urine</p> <p>D. Sfilare il catetere per permettere una migliore igiene del meato urinario</p>
4.	A	<p>In caso di persona assistita con diarrea bisogna:</p> <p>A. Consigliare una dieta povera di fibre</p> <p>B. Consigliare una dieta senza glutine</p> <p>C. Consigliare una dieta aproteica</p> <p>D. Tutte le risposte sono corrette</p>
5.	D	<p>Quali tra i sintomi sotto elencati sono possibili indicatori di sospetto infarto miocardico acuto?</p> <p>A. Dispnea</p> <p>B. Dolore epigastrico</p> <p>C. Sudorazione algida</p> <p>D. Tutte le risposte sono corrette</p>

6.	C	<p>Qual è la condotta corretta di fronte a segni di spostamento della sonda nasogastrica?</p> <p>A. Tagliare la sonda e fissare nuovamente</p> <p>B. Se la persona assistita non lamenta dolore è possibile continuare con la somministrazione</p> <p>C. Arrestare la somministrazione e informare immediatamente l'infermiere</p> <p>D. Spingere la sonda più in profondità</p>
7.	A	<p>La pressione arteriosa è:</p> <p>A. La forza esercitata dal sangue sulle pareti arteriose</p> <p>B. La forza esercitata dal sangue sulle pareti venose</p> <p>C. La forza esercitata dal sangue sulle pareti dei capillari</p> <p>D. La forza esercitata dal sangue sulle pareti dei vasi linfatici</p>
8.	A	<p>In caso di temperatura corporea elevata, come si modifica la frequenza cardiaca?</p> <p>A. Aumenta</p> <p>B. Diminuisce</p> <p>C. Rimane invariata</p> <p>D. Diventa aritmica</p>
9.	B	<p>Ad un paziente diabetico l'OSS può consigliare di avere cura dei suoi piedi:</p> <p>A. Lavandoli frequentemente con acqua a temperatura di 40-45 gradi</p> <p>B. Utilizzando calze morbide, senza cuciture e scarpe comode</p> <p>C. Tagliando le unghie molto corte</p> <p>D. Utilizzando scarpe strette</p>
10.	B	<p>L'OSS lavora utilizzando:</p> <p>A. Solo la comunicazione verbale</p> <p>B. Sia la comunicazione verbale che non verbale</p> <p>C. Isolandosi durante la sua attività</p> <p>D. Altre teorie della comunicazione</p>

11.		Che cosa si intende per posologia:
	C	<p>A. Dose di un farmaco</p> <p>B. Modalità e tempi di somministrazione di un farmaco</p> <p>C. Dose, modalità e tempi di somministrazione di un farmaco</p> <p>D. Farmacocinetica</p>
12.	B	<p>Le preparazioni auricolari vengono applicate:</p> <p>A. Nell'occhio</p> <p>B. Nell'orecchio</p> <p>C. Nel cavo orale</p> <p>D. Sulla cute</p>
13.	A	<p>Per detersione si intende:</p> <p>A. L'operazione volta alla rimozione meccanica dai substrati di qualsiasi traccia di sporco presente, con acqua e detergente</p> <p>B. L'azione atta a ridurre la carica microbica attraverso l'uso di mezzi chimici</p> <p>C. Il procedimento che, impiegando idonee sostanze chimiche, consente di ridurre il numero dei microrganismi presenti sui tessuti viventi</p> <p>D. L'azione atta a rimuovere le spore la carica microbica attraverso l'uso di mezzi chimici</p>
14.	B	<p>L'isolamento è:</p> <p>A. Una misura di profilassi delle malattie cardiocircolatorie</p> <p>B. Una misura di profilassi delle malattie infettive</p> <p>C. Una misura di profilassi delle malattie cronico degenerative</p> <p>D. Una misura di profilassi delle malattie infiammatorie</p>
15.	C	<p>Nella terminologia medica, la desinenza "-ite", indica una patologia di carattere:</p> <p>A. Degenerativo,</p> <p>B. Autoimmune,</p> <p>C. Infiammatorio</p> <p>D. Cronico</p>

16.	A	<p>Il termine Glucosio è sinonimo di:</p> <p>A. Zuccheri B. Protidi C. Lipidi D. Vitamine</p>
17.	D	<p>Quale dei seguenti non è un sintomo tipico dell'ipoglicemia grave?</p> <p>A. Tachicardia B. Sudorazione notturna C. Poliuria D. Alterazione del livello di coscienza</p>
18.	A	<p>Quale delle seguenti stomie è utilizzata principalmente per l'eliminazione delle feci?</p> <p>A. Colostomia B. Gastrostomia C. Tracheostomia D. Ureterostomia</p>
19.	C	<p>Una dieta povera di residui finalizzati a ridurre il volume e la frequenza delle evacuazioni si classifica come:</p> <p>A. Iperproteica B. Ipoproteica C. Astringente D. Lassativa</p>
20.	B	<p>Quale via di somministrazione farmacologica fornisce l'inizio d'azione più rapido e la disponibilità sistematica immediata?</p> <p>A. Via orale B. Via endovenosa C. Via intramuscolare D. Via sottocutanea</p>

21.		Come si definisce la temperatura corporea inferiore a 35°C?
	A	<p>A. Ipotermia</p> <p>B. Febbricola</p> <p>C. Ipotermia severa</p> <p>D. Ipertermia</p>
22.		Per eseguire l'aspirazione delle secrezioni orofaringee, quale postazione deve assumere la persona assistita?
	C	<p>A. Decubito supino</p> <p>B. Decubito prono</p> <p>C. Posizione semi seduta</p> <p>D. Di Trendelenburg</p>

23.	<p>Elencare tre situazioni specifiche in cui l'operatore deve obbligatoriamente procedere all'igiene delle mani tramite il lavaggio con acqua e sapone detergente, anziché utilizzare la soluzione idroalcolica per frizione.</p> <p>-Quando le mani sono visibilmente sporche o contaminate</p> <p>-Dopo aver manipolato gli alimenti (contaminazione da spore)</p> <p>-Dopo essere andato al bagno</p> <p>-Dopo aver chiuso Halipack</p> <p>-Dopo aver manipolato feci/urine</p> <p>(2 punti per ogni affermazione corretta, max 6 punti)</p>
-----	---