
 <p>Regione Lombardia ASL Bergamo</p>	<p>ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO</p> <p>COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE</p>	 <p>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo</p>
--	---	--

PREPARAZIONE E CONDIZIONI NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DI ISTEROSALPINGOGRAFIA

Per poter eseguire l'isterosalpingografia è necessario che la donna

- abbia assoluta certezza di non essere in stato di gravidanza; per tale motivo occorre avere rapporti sessuali protetti o astenersi da rapporti sessuali completi dall'inizio del ciclo mestruale fino all'esecuzione dell'esame.
- non abbia sanguinamento dai genitali; è quindi indicato che effettui l'esame 24-48 ore dopo il termine della mestruazione
- non sia affetta da infezioni genitali; è indicata l'effettuazione di tampone vaginale
- non abbia allergie al mezzo di contrasto (mdc); infatti, tenuto conto del parziale riassorbimento del mezzo di contrasto possono verificarsi alcune reazioni allergiche, anche tardivamente

e si sottoponga alla seguente preparazione

- digiuno da almeno 4 ore prima dell'esame
- clistere di pulizia il giorno dell'esame, prima di presentarsi in Radiologia
- accurata pulizia dei genitali esterni

In relazione a quanto sopra specificato, si consiglia di rivolgersi direttamente al Servizio di Radiologia (tel.) per concordare con gli operatori il giorno di esecuzione dell'indagine.

Si raccomanda di portare eventuale documentazione precedente (esami radiologici e/o ecografici con i referti) relativa alla richiesta e l'esito del tampone vaginale.

In caso di rinuncia si prega di avvisare tempestivamente chiamando il numero telefonico

N.B. Dopo l'esame è prevista una permanenza in osservazione di circa 30 minuti presso la struttura.



Regione
Lombardia

ASL Bergamo

ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE
STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE
E PRIVATE ACCREDITATE



Azienda Ospedaliera
Papa Giovanni XXIII
Bergamo

التحضير والشروط اللازمة لتنفيذ ISTEROSALPINGOGRAFIA

من أجل أداء **l'isterosalpingografia** هو ضروري للمرأة

- لديها يقين مطلق انها غير حامل، لهذا السبب تحتاج لممارسة الجنس الآمن أو الامتناع عن المعاشرة الجنسية منذ بداية الدورة الشهرية حتى هذا الفحص.
- ان لا يكون لديها نزيف من الأعضاء التناسلية ، لذلك أشير إلى أن الحفاظ على فحص 24-48 ساعة بعد انتهاء الحيض
- ان لا تكون هناك التهابات الأعضاء التناسلية ، وتنفيذ المسحة المهبليّة tamponne vaginale
- لا تعاني من حساسية على النقيض المتوسطة (حركة التغيير الديمقراطي) (mdc) mezzo di contrasto ، لامتناس جزء من المتوسط المقابل قد يكون هناك بعض أمراض الحساسية

إعداد وتحضير التالي:

- الصيام ما لا يقل عن 4 ساعات قبل الفحص
- تطهير م، قبل الحضور لقيام الأشعة radiologia
- تنظيف شامل للأعضاء التناسلية الخارجية

بالنسبة إلى ما سبق، يجب أن يذهب او يتصل **servizio radiologia** (هاتف:) إلى الاتفاق مع المشغلين في يوم تنفيذ المسح.

ومن الموصى به ان يتم احضار اية وثائق سابقة (الأشعة السينية الامتحانات و / أو الموجات فوق الصوتية مع التقارير) فيما يتعلق بالفحص ونتائج المسحة المهبليّة **tampone vaginale**.

في حالة إلغاء يرجى اعلامنا فوراً عن طريق الاتصال على رقم الهاتف

يرجى ملاحظة أن ومن المتوقع بعد الفحص على البقاء تحت الملاحظة لمدة 30 دقيقة في السجن.