



Regione
Lombardia

ASL Bergamo

**ASL DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO**

COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE
STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE
E PRIVATE ACCREDITATE



Azienda Ospedaliera
Papa Giovanni XXIII
Bergamo

Raccomandazioni per il paziente dopo Esofagogastroduodenoscopia senza sedazione

Gentile Signora, Egregio Signore

Lei è stato da poco sottoposta/o ad una indagine endoscopica del tratto digestivo superiore. Riteniamo pertanto utile fornirle alcuni consigli e indicazioni:

- ✓ può bere ed alimentarsi in modo leggero dopo circa 30 minuti dal termine dell'esame, salvo diversa indicazione
- ✓ può riprendere la normale assunzione delle sue medicine

Potrebbe rimanere un leggero indolenzimento a livello della parte interessata dall'esame endoscopico e/o gonfiore addominale se è rimasta aria nello stomaco, ma ciò si risolve di solito entro qualche ora.

Qualora dovesse accusare dolore severo e/o vomito o comparisse febbre, avverta subito il suo medico curante e/o il medico endoscopista.

Numero telefono struttura:



Regione
Lombardia

ASL Bergamo

ASL DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO

COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE
STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE
E PRIVATE ACCREDITATE



Azienda Ospedaliera
Papa Giovanni XXIII
Bergamo

Esofagogastroduodenoscopia senza sedazione

ما بعد منظار المريء المعدة والعفج

(الإثنى عشر وهو الجزء العلوي من الأمعاء) بدون تخدير
توصيات بعد الفحص

سيدي المحترم ، سيدتي المحترمة،

لقد قمت مؤخرا بمنظار الجهاز الهضمي العلوي بدون التخدير
إليك بعض النصائح المفيدة بعد هذا الفحص:

✓ يمكنك الأكل والشرب بكميات خفيفة بعد حوالي 30 دقيقة من نهاية الفحص (إلا في حالة
توصيات مختلفة)

✓ يمكنك الشروع في أخذ أدويةك ابتداء من هذا المساء

يمكن أن يظل لديك بعد الألم الطفيف في المكان الذي تم فحصه أو انتفاخ في البطن من جراء تواجد
الغاز به، لكن ذلك سيختفي من تلقاء نفسه و في غضون بعض ساعات.
أما إذا كانت لديك آلام شديدة، حمى أو تقيء، فيجب الإتصال فورا بالطبيب الخاص أو الطبيب الذي
أجرى لك الفحص بالمستشفى

رقم هاتف المرفق (Numero telefono struttura):