

 <p>Regione Lombardia</p> <p>ASL Bergamo</p>	<p>ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO</p> <p>COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE</p>	 <p>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo</p>
---	---	--

Raccomandazioni per il paziente dopo Esofagogastroduodenoscopia con sedazione

Gentile Signora, Egregio Signore,

Lei è stata/o da poco sottoposta/o ad una indagine endoscopica del tratto digestivo superiore ed ha ricevuto sedazione endovenosa. Riteniamo pertanto utile fornirle alcuni consigli e indicazioni.

Può alimentarsi dopo circa 30 minuti dal termine dell'esame, salvo diversa indicazione.
Può riprendere la normale assunzione delle sue medicine da stasera stessa.

Occorre stare a riposo per almeno 6 ore, durante le quali non può guidare l'auto o svolgere attività potenzialmente pericolose ed è opportuno bere ed alimentarsi in modo leggero.

Potrebbe rimanere un leggero indolenzimento a livello della parte interessata dall'esame endoscopico e/o gonfiore addominale se è rimasta aria nello stomaco, ma ciò si risolve di solito entro qualche ora.

Qualora dovesse accusare dolore severo e/o vomito o comparisse febbre avverta subito il suo medico curante e/o il medico endoscopista.

Numero telefono struttura:



Regione
Lombardia

ASL Bergamo

**ASL DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO**

COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE
STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE
E PRIVATE ACCREDITATE



Azienda Ospedaliera
Papa Giovanni XXIII
Bergamo

Oesophagogastroduodenoscopia (EGDS) avec sédation

RECOMMANDATIONS APRES L'EXAMEN

Chère madame/ cher monsieur

Vous venez de faire une endoscopie de la première partie de l'appareil gastro-intestinal avec sédation.

Voici quelques conseils utiles après l'examen:

- ✓ vous pouvez boire et manger environ 30 minutes après l'examen (sauf si vous avez reçu des indications contraires)
- ✓ vous pouvez recommencer à prendre vos médicaments à partir de ce soir
- ✓ vous devez vous reposer au moins 6 heures après l'examen: ne conduisez pas la voiture ou ne faites pas des activités potentiellement dangereuses, buvez et mangez léger.

Il pourrait rester des douleurs légères à la partie examinée ou un ballonnement abdominal s'il est resté de l'air dans votre estomac, mais cela va passer spontanément après quelques heures.

Par contre, si vous avez des douleurs abdominales, de la fièvre ou des vomissements, vous devez immédiatement contacter votre médecin ou le médecin de l'hôpital où vous avez fait l'examen.

Numéro de téléphone de la structure: