



Regione
Lombardia

ASL Bergamo

**ASL DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO**

COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE
STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE
E PRIVATE ACCREDITATE



Azienda Ospedaliera
Papa Giovanni XXIII
Bergamo

Raccomandazioni per il paziente dopo Esofagogastroduodenoscopia senza sedazione

Gentile Signora, Egregio Signore

Lei è stato da poco sottoposta/o ad una indagine endoscopica del tratto digestivo superiore. Riteniamo pertanto utile fornirle alcuni consigli e indicazioni:

- ✓ può bere ed alimentarsi in modo leggero dopo circa 30 minuti dal termine dell'esame, salvo diversa indicazione
- ✓ può riprendere la normale assunzione delle sue medicine

Potrebbe rimanere un leggero indolenzimento a livello della parte interessata dall'esame endoscopico e/o gonfiore addominale se è rimasta aria nello stomaco, ma ciò si risolve di solito entro qualche ora.

Qualora dovesse accusare dolore severo e/o vomito o comparisse febbre, avverta subito il suo medico curante e/o il medico endoscopista.

Numero telefono struttura:



Regione
Lombardia

ASL Bergamo

**ASL DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO**

COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE
STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE
E PRIVATE ACCREDITATE



Azienda Ospedaliera
Papa Giovanni XXIII
Bergamo

Esofagogastroduodenoscopia without sedative

RECOMMENDATIONS AFTER THE EXAM

Dear Madam / Dear Sir,

You have just taken an endoscopic exam of the upper digestive side.
These are a few helpful recommendations after the exam:

- ✓ You can eat or drink lightly after about 30 minutes from the end of the exam (unless you have had different instructions)
- ✓ You can start taking your medicines again as usual

You may have a light stiffness of the part affected by the exam or a swollen stomach if there is some air inside, but this passes spontaneously, usually within a few hours.

If instead you have important pains, vomit or a temperature, you must call immediately your doctor or the doctor of the hospital where you have taken the exam.

Hospital telephone number: