

 <p>Regione Lombardia ASL Bergamo</p>	<p>ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO</p> <p>COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE</p>	 <p>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo</p>
--	---	--

Raccomandazioni per il paziente dopo Esofagogastroduodenoscopia con sedazione

Gentile Signora, Egregio Signore,

Lei è stata/o da poco sottoposta/o ad una indagine endoscopica del tratto digestivo superiore ed ha ricevuto sedazione endovenosa. Riteniamo pertanto utile fornirle alcuni consigli e indicazioni.

Può alimentarsi dopo circa 30 minuti dal termine dell'esame, salvo diversa indicazione.
Può riprendere la normale assunzione delle sue medicine da stasera stessa.

Occorre stare a riposo per almeno 6 ore, durante le quali non può guidare l'auto o svolgere attività potenzialmente pericolose ed è opportuno bere ed alimentarsi in modo leggero.

Potrebbe rimanere un leggero indolenzimento a livello della parte interessata dall'esame endoscopico e/o gonfiore addominale se è rimasta aria nello stomaco, ma ciò si risolve di solito entro qualche ora.

Qualora dovesse accusare dolore severo e/o vomito o comparisse febbre avverta subito il suo medico curante e/o il medico endoscopista.

Numero telefono struttura:

 <p>Regione Lombardia ASL Bergamo</p>	<p>ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE</p>	 <p>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo</p>
--	--	--

Esofagostroduodenoscopia con sedación RECOMENDACIONES DESPUÉS DEL EXAMEN

Estimada Señora / Estimado Señor.

Ha hecho recientemente un examen endoscópico del aparato digestivo superior con sedación.

He aquí algunos consejos útiles después del examen:

- puede beber y comer ligero después de unos 30 minutos del final del examen (al menos que le hayan dado indicaciones diferentes).
- puede continuar a tomar sus medicinas desde esta noche.
- por al menos 6 horas después del examen tiene que estar en reposo: no conducir el coche o realizar actividades potencialmente peligrosas, beber y comer en modo ligero.

Podría quedar un ligero dolor a la parte interesada por el examen o una inflamación abdominal si ha quedado aire en el estómago, pero ésto pasa por si solo, generalmente dentro de algunas horas.

Si en cambio tiene dolores importantes, vómito o fiebre, tiene que llamar enseguida a su médico de base o el médico de la estructura donde hizo el examen.

Número teléfono estructura: