



## **RICERCA DI *STREPTOCOCCUS AGALACTIAE* IN TAMPONE VAGINALE E RETTALE**

Si raccomanda di eseguire questo esame alla 36<sup>a</sup> - 37<sup>a</sup> settimana di gravidanza per verificare lo stato di portatore del batterio, secondo la Linea guida 20 “Gravidanza fisiologica” del Ministero della Salute.

### **Come fare i tamponi**

La paziente può fare da sola i tamponi vaginale e rettale con il materiale fornito dall'ASST Papa Giovanni XXIII.

Vengono forniti 2 contenitori con terreno liquido di trasporto e relativi tamponi (tipo cotton-fioc): uno per il tampone vaginale ed uno per il tampone rettale.

#### **1. Tampone vaginale:**

- inserire un tampone in vagina per 2-3 cm e ruotarlo per raccogliere il secreto vaginale. Non eseguire lavaggi vaginali prima della sua esecuzione
- mettere il tampone nel primo contenitore e spezzarlo a livello della striscia rossa presente sul bastoncino

#### **2. Tampone rettale:**

- introdurre l'altro tampone nell'ano per circa 1 cm e ruotarlo per farlo sporcare di feci
- mettere il tampone nel secondo contenitore e spezzarlo a livello della striscia rossa presente sul bastoncino

### **Conservazione dei campioni raccolti**

E' possibile conservare i campioni raccolti in frigorifero, fino a un massimo di 24 ore.

### **Consegna campioni**

Consegnare entro 24 ore i campioni con l'impegnativa del medico al Punto prelievi, negli orari di accettazione.



## **RICERCA DI *STREPTOCOCCUS AGALACTIAE* IN TAMPONE VAGINALE E RETTALE**

Si raccomanda di eseguire questo esame alla 36<sup>a</sup> - 37<sup>a</sup> settimana di gravidanza per verificare lo stato di portatore del batterio, secondo la Linea guida 20 “Gravidanza fisiologica” del Ministero della Salute.

### **Come fare i tamponi**

La paziente può fare da sola i tamponi vaginale e rettale con il materiale fornito dall'ASST Papa Giovanni XXIII.

Vengono forniti 2 contenitori con terreno liquido di trasporto e relativi tamponi (tipo cotton-fioc): uno per il tampone vaginale ed uno per il tampone rettale.

#### **3. Tampone vaginale:**

- inserire un tampone in vagina per 2-3 cm e ruotarlo per raccogliere il secreto vaginale. Non eseguire lavaggi vaginali prima della sua esecuzione
- mettere il tampone nel primo contenitore e spezzarlo a livello della striscia rossa presente sul bastoncino

#### **4. Tampone rettale:**

- introdurre l'altro tampone nell'ano per circa 1 cm e ruotarlo per farlo sporcare di feci
- mettere il tampone nel secondo contenitore e spezzarlo a livello della striscia rossa presente sul bastoncino

### **Conservazione dei campioni raccolti**

E' possibile conservare i campioni raccolti in frigorifero, fino a un massimo di 24 ore.

### **Consegna campioni**

Consegnare entro 24 ore i campioni con l'impegnativa del medico al Punto prelievi, negli orari di accettazione.