



Ospedale
di Bergamo



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario

Gastroenterologia 2 - Endoscopia digestiva

Direttore Salvatore Greco

Preparazione rettosigmoidoscopia:

Gentile Signore/a, per prepararsi correttamente all'esecuzione della RETTOSIGMOIDOSCOPIA Le raccomandiamo:

Se l'esame è programmato tra le 8:00 e le 13:00:

La SERA prima dell'esame (dopo la cena): eseguire un clistere evacuativo somministrando un flacone di clistere da 133 ml (es. Clisma Fleet, Clisma Lax)

La MATTINA del giorno dell'esame (2-3 ore prima dell'ora programmata): eseguire un clistere clistere evacuativo somministrando un flacone di clistere da 133 ml (es. Clisma Fleet, Clisma Lax)

Se l'esame programmato dopo le 13:00:

La MATTINA del giorno dell'esame:

-quattro ore prima dell'ora programmata: eseguire un clistere evacuativo somministrando un flacone di clistere da 133 ml (es. Clisma Fleet, Clisma Lax)

-due ore prima dell'ora programmata: eseguire un clistere evacuativo somministrando un flacone di clistere da 133 ml (es. Clisma Fleet, Clisma Lax)

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Non sono richieste prescrizioni particolari per la dieta nei giorni precedenti la rettoscopia.

Abitualmente non è prevista la sedazione. In alcuni casi può essere necessaria la somministrazione di un sedativo/analgesico pertanto si consiglia precauzionalmente di presentarsi a digiuno da sei ore.

In caso di somministrazione di analgesico/sedativo sarà necessario essere accompagnati e sarà indicato non guidare e non svolgere attività che richiedono concentrazione nelle successive 12 ore.

Nel caso in cui sia prevista una procedura operativa (es. rimozione di un polipo) potrebbe essere più opportuno eseguire una preparazione intestinale completa come per colonoscopia; in questi casi è indicato confrontarsi con lo specialista che ha prescritto la procedura prima dell'esame.

Pazienti in terapia antiaggregante/ anticoagulante:

Rettosigmoidoscopia: per l'esame diagnostico non è necessario sospendere la terapia antiaggregante/anticoagulante. Se in terapia con anticoagulanti orali diretti si raccomanda di non assumere la dose del mattino il giorno dell'esame.



Ospedale
di Bergamo



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Gastroenterologia 2 - Endoscopia digestiva

Direttore Salvatore Greco

Rettosigmoidoscopia operativa: (es. polipectomia, dilatazione, mucosectomia): la terapia con acido acetilsalicilico può essere proseguita. Se in terapia con anticoagulante/ o altro antiaggregante (es. clopidogrel) è necessario consultare lo specialista di fiducia o il proprio Curante per valutare la sospensione o modifica della terapia.